

Natices jaunes d'œuf, *Natica vitellus*.

Presque globuleuse, l'ombilic entièrement perforé.

*Nerita vitellus*. Linn. — *Lister*, tab. 565. fig. 12. *Gualt.* tab. 67. fig. 1. *Chemn. Conch.* 5. tab. 186. fig. 1866, 1867.

Se trouve dans la mer des Indes.

Natices blanches d'œuf, *Natica albumen*.

Convexe, ombilic presque en cœur; le sommet de l'apophyse applati.

*Nerita albumen*. Linn. — *Rumph.* tab. 22. fig. B. *Chemnitz*, *Conch.* 5. tab. 189. fig. 1924, 1925.

Se trouve dans la mer des Indes et sur les côtes de Barbarie.

Natices mamelons, *Natica mamilla*.

Ovale, glabre, l'ombilic presque couvert; l'ouverture ovale.

*Nerita mamilla*. Linn. — *Rumph.* tab. 22. fig. F. *Lister*, tab. 566. fig. 14. et 171. fig. 22. *Dargenville*, pl. 7. fig. X. *Chemn. Conch.* 5. tab. 187. fig. 1881 et 1884.

Se trouve dans la mer des Indes.

N. à zones blanches, *Natica leucozonias*.

Presque globuleuse, solide, fauve, fasciée de blanc; la spire comprimée.

*Nerita leucozonias*. — *Kaemmer*, *Conch. Rudolst.* tab. 12. fig. 5, 6.

On ignore le lieu d'où elle vient.