

fibreux. Les cellules jeunes, qui sont à la périphérie des cylindres, sont implantées perpendiculairement au tissu fibreux. Les cellules voisines deviennent polyédriques, se colorent d'une façon moins intense et celles qui sont au centre des boyaux paraissent avoir subi une certaine dégénération cornée.

En somme, il s'agissait d'un épithélioma. Ce qu'il y a de particulier dans ces coupes, c'est la réunion sur une même tumeur de trois des types classiques de l'épithélioma de la peau.

Au point de vue clinique, nous ferons encore remarquer les difficultés et les hésitations du diagnostic, et nous insisterons sur le bénéfice qu'a retiré le malade d'une intervention radicale, et qui au premier abord paraissait excessivement grave et compliquée.

Paris, janvier 1896.

Balanite.

Bains généraux prolongés. Repos. Chaque jour trois bains locaux tièdes avec de l'eau de guimauve suivis d'une irrigation avec de l'eau boriquée tiède. On la fait avec une seringue urétrale introduite entre le prépuce et le gland. Chaque irrigation exige un litre d'eau. Immédiatement après, faire une injection avec :

Nitrate d'argent.....	1 gramme
Eau distillée.....	100 "

Fournier.

Blennorrhagie.

Extrait de Saturne.....	4 grammes
Sulfate de zinc.....	0 gr. 40
Laudanum de Sydenham.....	0 gr. 40
Eau distillée	200 grammes

F. S. A. Usage externe.—*Dujardin-Beaumetz.*

Eronchite aiguë.

Poudre de polygala.....	8 grammes
Racine d'ipéca concassée.....	4 "
Eau bouillante.....	150 "
Infuser, filtrer et ajouter	
Miel dépuré.....	60 "

Par cuillerées à café.—*Trousseau.*

Bronchite chronique.

Vin créosoté

Créosote de hêtre.....	3 grammes
Alcool	100 "
Vin de Bagnols	300 "
Sirop simple.....	100 "

1 à 2 cuillerées à bouche matin et soir dans un verre d'eau sucrée avec du sirop de groseilles.—*Dujardin-Beaumetz.*