Hyperhydrose plantaire.

MM. Nicolas et Jambon recommandent les iavages fréquents avec des solutions astringentes, par exemple:

Tanin		 	 	 . 4 grammes
Alun		 	 	 . 20 —
Eau 1000

Si les sucurs sont fétides, on peut substituer à ces solutions soit le bain de pied au permanganate de potasse à 1/1000, soit le bain de pied acidulé.

dans un bain de piedenporcelaine ou en faïence, répéter tous les trois jours, pendant dix minutes.

Dan l'intervalle, poudrer l'intérieur des chaussettes avec:

Tale	40	grammes
Salicylate de bismuth	30	
Oxyde de zinc	20	
Alun pulvérisé	10	,

Mais le traitement de choix est le badigeonnage au formol:

Formol à 40 p.	100	 	10 grammes
eau distillée		 	100 -

trois à quatre badigeonnages dans le courant de la saison.

Pour les personnes à peau dell ate, on peut étendre la solution ou l'additionner de glycérine.

Adénites tuberculeuses (Injections).

1°)	Huile	70 gr.
	Ether	30 gr.
	Créosote	5 gr.
	Gaîscol	1 gr.
	Iodoforme	10 gr.
2°)	Naphtol camphré	2 gr.
	Glycérine:	

(CALOT).