

Gen. ARENETRA, Holm XII, p. 77.

A l'espèce décrite, ajoutez la suivante.

Arenète noirette. *Arenetra nigrita*. Walsh. Trans. Am. Ent. Soc. iii, p. 159. ♀♂.

♂—Long. .40 pce. Noire; la tête, le thorax et la base de l'abdomen avec une pubescence grisâtre longue mais peu dense, cette pubescence plus dense sur la tête et les flancs. Thorax court, gibbeux en avant; les écailles alaires noires. Ailes légèrement enfumées, les nervures noires; aréole triangulaire, subpétiolee. Pattes noires, les genoux, les jambes et les tarsi d'un roux brunâtre. Abdomen atténué aux 2 extrémités, le 1er segment finement rugueux transversalement, les terminaux polis, le 4e et les suivants finement marginés par une ligne pâle.

♀—Avec les cuisses antérieures brun-roussâtre; la tarière environ de la moitié de l'abdomen en longueur.

Diffère surtout de la *Canadensis*, Cress. par sa pubescence blanchâtre et non noire.

Gen. MENISCUS, Schiodte XII, p. 78.

Aux 3 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Ménisque marginé. *Méniscus marginatus*, nov. sp.

♀—Long. .30 pce. Noir; la face noir-foncé sans aucune tache; antennes brun-foncé, plus courtes que le corps. Thorax court et épais, les écailles noires. Ailes hyalines, les nervures noires, blanches à la base; aréole subrhombilale, noire, blanche à la base. Pattes rousses, y compris les hanches et les trochantins; les jambes postérieures noires avec un anneau blanc près de la base, leurs tarsi aussi noirs, tachés de blanc à la base du 1er article. Abdomen fort, lisse, très finement ponctué, tous les segments finement marginés de roux au sommet; tarière forte, plus courte que l'abdomen.

Capturé à Québec par M. l'abbé Huart.

Gen. ECHTHRUS, Grav. XII, p. 97.

Aux 6 espèces décrites, ajoutez la suivante.

4. Echthrus nigricornis, Prov. p. 486; ci-suit la description de la ♀.

♀—La face noire; le scape des antennes brunâtre en dessous. L'extrémité des cuisses postérieures avec leurs jambes et leurs tarsi, noir. Tarière grêle, de la longueur de l'abdomen environ.