

Sociétés Médicales.

ASSOCIATION NEUROLOGIQUE AMÉRICAINE.

Séance des 21, 22 et 23 juin 1882.

Présidence du Dr W. A. Hammond, (New-York).

Le Dr BANNISTER, de Chicago, donne lecture d'une note sur les *symptômes de manie aiguë* se produisant durant le cours de la médication bromurée, dans le traitement de l'épilepsie.

D'après l'expérience du Dr B... ces symptômes se sont manifestés dans un cinquième des cas d'épilepsie traités par les bromures.

Le Dr S. G. WEBER communique quelques observations sur la *paralysie saturnine* et conclut que cette forme de paralysie ne dépend pas d'une lésion de la moëlle, mais est dès le début le résultat d'une névrite. Le pronostic doit être considéré comme favorable dans les cas récents.

Certains cas d'intoxication saturnine simulent à s'y méprendre l'inflammation de la moëlle épinière.

Le Dr CHS. K. MILLS, de Philadelphie rapporte douze cas de tumeur cérébrale, et appuie sur les signes diagnostiques suivants :

1^o *Céphalalgie* : fut présente dans tous les cas. La douleur était continuelle, d'une intensité persistante, et toujours caractérisée par de violentes exacerbations.

2^o *Percussion du crâne* : fut pratiqué dans trois cas et l'on put constater que la douleur était aussi augmentée au point correspondant au siège de la tumeur. Le Dr M... croit que la percussion du crâne doit aider beaucoup à localiser la maladie.

3^o *Vomissements* : Se montrèrent dans huit cas ; furent absents dans les cas où la tumeur occupait la région frontale.

4^o *Vertige* : Ce symptôme, y compris les étourdissements, la démarche chancelante, et l'impossibilité de se tenir debout sans danger de tomber, fut remarqué dans dix cas.

5^o *Les troubles du côté de l'intelligence* se montrèrent dans tous les cas et furent surtout d'un caractère émotionnel.

6^o *Anesthésie* : fut observée dans sept cas.

1^o La névrite optique se montra dans cinq cas ; dans trois autres il y eut névrite descendante.

— Dans tous les cas la température de la tête était élevée.