pagation de l'espèce, telles sont les accidents puerpéraux, autres que la métrepéritonite puerpérale, les cas de mort par vieillesse, usure, sans indication de maladie particulière, mais le plus grand nombre des décès sous ce titre se compose des enfants morts peu après l'acconchement (naissances prématurées, vices de conformation, maladies congénitales, débilité infantile.) Dans la cinquième division sont rangés les cas de mort par accidents, blessures, plaies et traumatismes, brûlures, asphyxies, empoisonnements, suicides, etc.

Les remarques suivantes nous ont été transmises par M. le Dr. Larocque, officier de santé, en même temps que le tableau de la mor-

talité publié ci-après.

"J'ai cru intéresser le public, mais surtout les médecins et les amis de la santé en publiant la mortalité du mois dernier. Je me pro pose de le faire mensuellement afin de pouvoir comparer de mois en mois l'état sanitaire de la ville.

"Nous voyons par ce rapport que la petite vérole sévit encore as sez sévèrement, quoiqu'à cette époque de la saison l'aëration des legements soit meilleure qu'en hiver. Aucun doute qu'outre la négligence de la vaccination, une des causes de la propagation de la variole, c'est que les legements où ont résidé les varioleux, ainsi que les effets dont ceux-ci faisaient usage ne sont pas umis à la désinfection. Il est bien constaté que de nombreux cas de variole doivent leur origine à cette cause.

"Si nous voulons faire disparaître le terrible fléau de la variole, il faut d'abord de toute nécessité reconrir à la vaccination et même à la revaccination, à présent surtout que nous avons du vaccin sur lequel nous pouvons compter. J'ai des preuves convainquantes de l'efficacité du vaccin nouveau. J'ai dernièrement vacciné plusieurs qui l'avaient été précédemment deux, trois et même quatre fois sans résultat. Je suis convaincu que je dois mon succès à la lymphe du Se jour que j'emploie. Depuis que j'ai adopté ce mode, mes vaccinations sont infiniment supérieures à celles que je faisais autrefois avec la gale. Les vésicules sont plus élevées et plus pleines, les gales qui en résultent ont le vrai caractère jénnérien, c'est-à-dire, elles sont transparentes, ombiliquées, l'épaisseur est d'à peu près un tiers de la longueur. C'est avec raison que tous les auteurs qui ont écrit sur ce sujet et les vaccinateurs expérimentés recommandent cette méthode.

"Afin de satisfaire les familles désireuses de se faire vacciner par leur médecin, le Bureau de Santé a donné instruction à quelques hommes de la police sanitaire de passer de maison en maison afin de prendre le nom du médecin de la famille dans le but d'envoyer à celui-ei une liste des familles qui désirent l'avoir pour vacciner. Je puis fournir tous les jours des pointes de lymphe frische à ceux des confrères qui désirent s'en procurer.

"Les autres mesures à prendre contre les ravages de la variole,