


seille de l'administrer, quand l'estomac est bien tolérant, en une seule fois le matin une heure avant le premier repas, mais nous préférons la méthode de Mathieu, qui consiste à donner 10 grammes une heure avant le premier repas et une heure après le dernier ou encore 5 ou 6 grammes $\frac{1}{2}$ heure avant chaque repas, méthode de rigueur si l'estomac est très intolérant. Quelque soit le mode d'administration adopté, le bismuth sera délayé dans un demi-verre d'eau. Après l'ingestion de cette bouillie, le malade devra se tenir 5 minutes sur le dos, cinq minutes sur le ventre et cinq minutes sur les côtés, de façon à bien étendre le sel sur la surface muqueuse et à en faire un pansement protecteur. Pour Lion, son action ne serait pas purement mécanique, il amènerait la disparition presque complète de l'hyperchlorydrie et diminuerait considérablement l'énergie du processus digestif, précipitant dans certaines conditions l'évolution digestive et l'évacuation de l'estomac.

Hayem a, pour ces raisons et d'autres énoncées plus loin en parlant du bicarbonate de soude, remplacé les alcalins par le bismuth.

La mode existe même en thérapeutique ; le traitement des gastropathies par le bismuth est à la mode. Persistera-t-il ou subira-t-il le sort de tant d'autres médications ?

ODILON LECLERC.



ENSEIGNEMENT MEDICAL INTERNATIONAL.—1909

Poursuivant le programme qu'elle a adopté en 1905, l'*Œuvre d'Enseignement Médical Complémentaire par la Visite des Universités Étrangères*, fera en 1909 son voyage d'études à travers l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande.

Le programme est en préparation et paraîtra dans le numéro de janvier de *L'Enseignement Médico-mutuel International*, l'intéressante revue professionnelle, qui publie en ce moment une enquête toute d'actualité sur le Privatdocentisme.