


EMEdu marché.
fois par moiscrème à Québec
al, vous sauvez à
côté de l'Express.**IRY, Ltd.**
UEBECdu rendement en foin, et que
trèfle rouge doivent, pour être
sous la première coupe en
concours de trèfle doit se faire
en espèce de trèfle rouge, soit le
et non les deux espèces indiffé-ne doivent primer que les con-
mérivent de l'être et aucun
être accordé à ceux qui con-
s de 65 points sur 100.des champs est faite par des
et payés par le ministère deconcurrent doit faire connaître
l de la maison l'endroit précis
mis au concours, afin d'évi-
rs ou les malentendus qui
venir, lorsque le juge fait sa
gence du propriétaire.entré dans un concours de
pied doit être apte à produire
emence.ire de la société doit envoyer
e 1er juillet, au chef du service
Culture, la liste des inscrip-
concours que la société désireiter toute confusion, nous
qu'une société d'agriculture
ser soit les concours compris
Allocation No 1 (concours
et concours de trèfle) ou bien
de récoltes sur pied, décrits
Allocation No 2.

ministre de l'Agriculture.

J.-ANTONIO GRENIER.

onde de la finance.—La mai-
tre Darveau Limitée vient
bureau à Québec au numéro 93
e. Ces banquiers en obliga-
nt une grande expérience dans
des obligations et vont se
urton dans la vente d'obliga-
unicipalité, valeurs reconnues
ent de tout repos.**TEUSE COMBINÉE**
QUEBEC
LE à 50% du prix du
marchand.ne de trèfle récoltée localement
es qualités germinatives que vous
pas chez la graine de provenance
qui contient, cependant, des
es graines souvent étrangères à
on.pouvez récolter votre graine de
de quelques centaines de livres
que vous possédez, en propre ou
la machine voulue pour le bat-
aucune perte.emandez catalogue "B"
nderie de Plessisville
ESSISVILLE, P. Q.**Le Rendez-vous des Eleveurs****LA TUBERCULOSE***Un moyen peu coûteux de l'empêcher de se transmettre à tout le troupeau***ISOLER ET DESINFECTER**

Un de nos lecteurs nous demandait autre de jeunes animaux destinés à récemment, de lui indiquer un moyen l'abattoir. *N'oubliez pas que le lait de peu coûteux d'empêcher la tuberculose vaches malades ne peut être consommé de se propager quand elle entre dans une qu'après avoir été bouilli.*

Notre confrère, LE PAYSAN, vient de répondre à cette question.

La tuberculose, dit-il, est une maladie contagieuse, c'est-à-dire une maladie qui se transmet par les microbes d'un animal à l'autre, soit d'une manière directe ou indirecte. La lutte a donc essentiellement pour but de mettre obstacle à cette action microbienne, ou du moins de l'enrayer le plus possible.

A cette fin, éloignez ou isolez les cultivateurs qui désinfectent leurs étables, vont même jusqu'à les dépaver ou à exécuter d'autres travaux non moins coûteux, sans qu'ils en retirent plus tard le moindre avantage. Cet échec n'est dû le plus souvent qu'à la manière défective dont ils ont fait la désinfection : ils ont, en effet, négligé d'améliorer les conditions hygiéniques en ce qui concerne l'éclairage, l'aération et la propreté, ou bien ils ont commis l'imprudence de réinstaller dans les étables désinfectées ou réparées, des animaux malades ou suspects qui, de nouveau, se sont mis à propager les germes morbides.

En pratique, il n'est pas toujours possible d'observer toutes ces prescriptions ; le cas échéant, efforcez-vous de remédier à la situation de la manière que voici :

Ecartez immédiatement tous les animaux qui manifestent des symptômes évidents d'affections graves, tels que : toux ininterrompue, expectorations visqueuses, amaigrissement persistant, ulcération ou inflammation fréquente du pis, irritation répétée, diarrhée permanente.

En outre, dans les étables contaminées, faites examiner toutes les bêtes qui ne donnent encore aucun signe de maladie. Cet examen doit être fait par le vétérinaire. Les animaux que l'épreuve indique comme suspects, seront isolés des autres et ensuite mis en vente, après stérilisation ou engrangement.

S'il résulte des symptômes susmentionnés que la contagion est en voie de progrès, vous ferez bien d'éloigner les animaux avant que l'amaigrissement n'ait diminué leur valeur marchande dans des proportions trop sensibles. Si vous ne pouvez isoler à la ferme les sujets suspects des bêtes non encore atteintes, placez entre les uns et les

**Quelques conseils
AUX
Eleveurs de moutons**

Faites sécher vos moutons lentement à l'ombre. Jamais au soleil.

Ceux qui n'ont pas encore tondu leurs moutons y verront bientôt.

Ne vous servez jamais d'une solution qui a servi à un lavage antérieur.

La castration doit se pratiquer de préférence le matin d'une journée ensoleillée.

On ne saurait mettre en doute qu'il est très avantageux de castrer (châtrer) les agneaux.

Il est important d'apporter beaucoup d'attention au troupeau de moutons à ce temps-ci de l'année.

Les agneaux doivent subir cette opération dès qu'ils ont atteint une dizaine ou une quinzaine de jours.

L'écourtage peut aussi être fait en même temps, mais il est préférable de laisser écouter une couple de jours entre chaque opération.

Désinfectez tous les moutons et brevets, parce que ceux qui n'auraient

**Essai de 30 Jours
Gratuit**

Nous expédierons

**FRAIS
PAYÉS**

Aucune obligation à acheter, mais si vous le faites, les termes les plus faciles seront arrangés.

Garantie pour dix ans.

Agents requis où nous ne sommes pas représentés. 30F

Swedish Separator Company, Limited
36a, rue Notre-Dame Ouest, Montréal**VÉRÉMEUSE
VIKING**

Machine à séparer la viande et les os.

Machine à séparer la viande et les os.