Hartzell le recommande aux doses de 1 gramme, répétées trois ou quatre fois par jour. Sous l'influence de la médication, le prurit s'amenderait rapidement. Darier ne croit guère à ces heureux résultats. En dehors de l'arsenic, rappelons encore l'électricité sous forme de bains statiques et surtout de courants de haute fréquence. L'hydrothérapie avec douches tièdes constitue une autre méthode excellente de traitement. Le salicylate de soude ne vient que bien après.

5e L'emploi du salicylate de soude comme "traitement préventif de l'érysipèle" apparaît plutôt à la façon d'une curiosité de la boratoire que comme un mode de traitement entré dans la pratique, MM. Lortat-Jacob et Vitry ont démontré que l'injection intra-veineuse de petites doses de salicylate augmente la résistance du lapin à des inoculations consécutives d'une culture de streptocoques. De là à proposer cette médication aux personnes entourant un érysipélateux, il y a loin et nul médecin n'y songerait.

6e Dans les "iritis rhumatismales," M. Darier emploie le remède en injections intra-veineuses.

Salicylate de soude	5 grammes
Caféine	0 gr. 50
Eau distillée	25 grammes

Dose 2 à 3 centimètres cubes, soit 0 gr. 50 de salicylate, dans une veine du pli du coude. Les malades seraient calmés dès le début et l'inflammation locale s'atténue rapidement. Aux médecins qui useraient de cette médication, nous recommandons de faire préparer le liquide en ampoules stérilisées de 2 centimètres cubes; jamais les soins d'asepsie ne sont trop minutieux.

7e Le traitement "externe" par le salicylate n'occupe qu'un rang secondaire dans la pratique. Dans les affections pharyngo-buccales, on use plutôt de gargarismes ou de lavages à l'eau oxygénée (une cuillerée pour trois à quatre cuillerées d'eau de Vichy), de chlorate de potasse (une cuillerée à café par verre d'eau), de borate de soude (15 p. 500). Comme nous ne parlerons pas de ces différents médicaments, nous devons nous tenir au salicylate pour les soins de la bouche.

Salicylate de soude	20 grammes
Eau distillée	1000 —

Pour lavage de la bouche dans les différentes stomatites toutes les deux ou trois heures. M. E. Hirtz conseille, dans la stomatite aphteuse, les badigeonnages au salicylate en solution concentrée (20 p.c.). après les repas, soit trois à cinq fois par jour.

Mélangé à la poudre de talc ou au sous-nitrate de bismuth, le salicylate de soude combat l'odeur fétide dans "l'hyperhidrose du pied." Mais les bains de pied au formol (une cuillerée à soupe de formol du commerce par litre d'eau) suivi de poudrage a-

vec une poudre astringente, tannin ou alun, pour 10 grammes de poudre de talc agissent mieux.

II.—"ACTION SPECIFIQUE."

Si le salicylate de soude peut être remplacé, dans les diverses affections dont nous avons parlé, il n'en est plus de même au cours du rhumatisme articulaire aigu. Ici, il règne en maître et défie tout égal.

À l'enfant, on ordonne, dès la première apparition des douleurs articulaires, si atténuées qu'on les prend parfois pour des douleurs de croissance, 0 gr. 40 du remède par année d'âge et par vingt-quatre heures; la dose de 6 à 8 grammes est habituelle pour un adulte. La façon de prescrire des paquets de 2 grammes à renouveler trois à quatre fois dans le jour. Chaque paquet est dissous dans une infusion de feuilles de frêne, qui sera avalée par petites gorgées, de façon à être prise dans l'intervalle de deux heures environ: une tasse de tisane le matin, une autre dans l'après-midi, une autre dans la nuit. Cette dernière précaution est essentielle. "Pendant que le malade dort, le rhumatisme veille" (Huchard). La prescription nocturne du médicament semble un des meilleurs moyens propres à entraver l'apparition d'une endocardite.

À côté de la "voie stomacale," on peut encore utiliser la "voie hypodermique ou intra-veineuse." Nous ne signalons que pour la rejeter la méthode "intra-articulaire." Santini (de Sienne) préconise une injection intra-articulaire d'une solution aqueuse à 3 p. c. En dépit des précautions d'asepsie, la médication est dangereuse et nous y renonçons. La "voie hypodermique" ne donne pas grands résultats. Quand il s'agit d'une application locale, le salicylate de méthyle nous a semblé préférable (pur, aux doses de 8 à 15 gr.).

La voie "endo-veineuse" a été préconisée par Mendel. La veine du pli du coude étant distendue par un tour de crépon, on y injecte 2 centim. cubes par jour du liquide:

Salicylate de soude	8 grammes
Caféine	1 gr. 25
Eau distillée	50 grammes

L'auteur se loue fort de la méthode. Dans les formes habituelles du rhumatisme, elle ajoute une complication inutile au traitement. On ne recourra à ce procédé qu'après échec de la médication gastrique, unie aux applications externes. Les doses de 8 gr. à 10 gr. de salicylate peuvent devenir indispensables dans les formes graves. Elles sont la meilleure manière de prévenir le rhumatisme cérébral. Si celui-ci éclate on continuera, le remède, associé aux bains froids de 20° à 25° toutes les 3 heures, tant que la température dépasse 39°. Si l'estomac du malade est intolérant et que la voie externe (15 à 18 gr. de salicylate de méthyle) ne produise aucune sédation, alors seulement la voie