

carènes longitudinales, avec 3 appendices anaux chez les ♂ et 2 chez les femelles.

Ces insectes, comme ceux de la famille précédente, sont essentiellement carnassiers. On les voit de la fin de Mai à la fin d'Août dans les champs, les prairies, sur les buissons etc. à la chasse d'autres insectes plus faibles qu'ils saisissent au vol. Quelques uns sont ornés de couleurs fort brillantes, et chez la plupart, la transparence des ailes est interrompue par des séries de taches d'un jaune plus ou moins obscur, d'une façon souvent fort agréable.

Toutes les espèces que nous avons rencontrées se répartissent dans les 6 genres qui suivent.

Yeux prolongés postérieurement en un petit tubercule lisse;

Crochets des tarsi bifides ..... 1. *MACROMIA*.

Crochets des tarsi simplement dentés;

Ailes postérieures ♂ arrondies à l'angle anal..... 2. *EPITHECA*.

Ailes postérieures ♂ anguleuses à l'angle anal.... 3. *CORDULIA*.

Yeux non prolongés postérieurement;

Lobe postérieur du prothorax petit, entier;

8e segment abdominal ♀ dilaté aux côtés..... 4. *PLATHEMIS*.

8e segment abdominal ♀ non dilaté aux côtés.. 5. *LIBELLULA*.

Lobe postérieur du prothorax grand, bilobé..... 6. *DIPLAX*.

1. Gen. *MACROMIE*. *Macromia*, Ramb.

Yeux très gros, contigus, offrant vers leur milieu postérieurement un prolongement en forme de tubercule lisse, séparé du reste de l'œil par une fossette sinueuse. Triangles des ailes postérieures beaucoup plus larges que dans les Libellules, leur bord anal anguleux chez les ♂. *Crochets des tarsi bifides*, ayant la dent inférieure aussi longue que leur pointe. 2e segment abdominal auriculé chez les ♂.

Une seule espèce rencontrée.

**Macromie transverse.** *Macromia transversa*, Say. — ♀ Long 2. 20 pouces; extension des ailes 3 pouces. D'un brun roussâtre, vélu, Front avec une bande tranverse jaune, excavé en dessus, avec une tache jaune de chaque côté. Thorax brun-roussâtre, les côtés avec une bande oblique blanchâtre, s'unissant à une de même couleur sur le dos. Abdomen fort, presque cylindrique, brun-roussâtre, les segments plus pâles à la base. Appendices bruns, courts. Pattes roussâtres, les jambes jaunes extérieurement, les tarsi noirs. Ailes hyalines, à nervures roussâtres, avec une tache longitudinale basilaire