

ses travaux. Capturée à St-Hyacinthe ; nous ne l'avons pas encore rencontrée dans le voisinage de Québec.

7. **Fourmi jaune.** *Formica flava*, Fab. ; St-Fargeau i, p. 208, ♂ ♀ §.

♀—Long. .35 pce. D'un brun roussâtre, les pattes et les antennes d'un roux jaunâtre clair. Ailes d'un jaunâtre un peu opaque, les nervures et le stigma jaunes, la lère discoïdale parfaite. Ecaille abdominale presque carrée, velue, avec une échancrure aiguë au sommet, le reste de l'abdomen de forme un peu allongée, à pubescence courte.

♂—Différent peu de la ♀, les antennes un peu plus grêles, la couleur du corps un peu plus claire ; l'écaille abdominale aussi un peu échancrée.

§—Corps d'un roux jaunâtre luisant, un peu pubescent, l'abdomen souvent un peu plus foncé. L'écaille abdominale presque carrée, entière.

Cette espèce établit son nid sur le bord des chemins, dans les champs etc., élevant au dessus un monticule peu considérable.

## 2. Gen MYRMIQUE. *Myrmica*, Latr.

Tête triangulaire, sans épines ; mandibules triangulaires. Palpes maxillaires longs, de 6 articles. Thorax assez robuste, plus grêle et comprimé postérieurement dans les §, portant deux épines allongées sur ses angles postérieurs dans les ♀ et les § et seulement 2 mucrons dans les ♂. Ailes avec 3 cubitales, la nervures de division entre les 2e et 3e cubitales souvent absolète, la première discoïdale seule fermée. Abdomen avec les 2 premiers segments allongés en pédicule et plus ou moins noduleux. Les ♀ et § sont armées d'aiguillons.

La forme du pédicule de l'abdomen avec ses 2 articles noduleux suffit pour faire distinguer les Myrmiques des Fourmis à première vue.

Trois espèces rencontrées, dont une nouvelle.

Couleur, brun roux ou brun roussâtre ;

La nervure de division entre les cubitales

1 et 2 incomplète,..... 1. *incompleta*, n. sp.

La nervure entre les cubitales 1 et 2 complète.. 2. *tuberum*.

Couleur jaune pâle ; taille très petite..... 3. *molesta*.