

NEURITIS.

Anæsthesia Paralysis.

施迷蒙藥之癱瘓

(一)施手術之時、其系或受壓、如臂系羅爲髌所壓、或纏髌系爲手術牀所壓、是以器具持其腿者、其股亦或受累、以壓岷器壓其岷緊者、或致重癱。

(二)施迷蒙藥傷及顱腦之癱、此其病原、或即岷破裂、或絡爲漂團所塞。

診斷

此其電應、上文已詳、中酳者無難診斷、如手足痠而盈血及有特別之昏譫者、則不復有疑義焉。四肢癱而急進者、其面肌及肛脰圍肌或受其累、有視諸脊腦病者、然多半以爲系病也。不甚急者、其癱漸累臂腿而急瘦、此其與脊腦病之枯癱稍急者、甚爲相若。其與肌動失和症之區別、無甚難事、蓋其步狀既大不相同、而系炎者亦少有肌動失和之狀、眼閉亦無欲傾狀、擱痛及瞳應之狀、亦皆無之、肌動失和症者、亦罕有足痠之患、且其病原亦皆在在可考也。

治法

靜臥以息、是爲最要、急而熱者、或可服之楔強攀、或安替派林也、止其大痛、或用莫非、或敷以熱水襖、中酳者、其所飲之酒當漸減之、臥瘍亦在所最當防之列、其肌自病初即宜輕擦之、後程肌枯而不痛者、可用揉捏