

I. — *Dyspepsie asthénique* :

On peut donner l'une des poudres suivantes environ une heure avant les repas.
(poudre en cachet),

- 1° Bicarbonate de soude..... 0 gr. 75 centigr.
Phosphate de soude..... 0 gr. 25 —

ou bien : 1)

- 2° Bicarbonate de soude..... }
Chlorure de sodium..... } à à 0 gr. 50 centigr.

De l'une ou de l'autre, une avant le repas, environ une heure avec eau.

- 3° Bicarbonate de soude..... 1 gramme
Poudre de noix vomique..... 0 gr. 05 centigr.

A prendre une heure avant le repas.

- 4° Bicarbonate de soude..... 0 gr. 75 centigr.
Quassine amorphe..... 0 gr. 05 —

Une heure avant le repas.

- 5° Bicarbonate de soude..... 0 gr. 75 centigr.
Poudre de quinquina..... }
Poudre de cascarille..... } à à 0 gr. 15 centigr.

Une avant chaque repas, une heure. (d'après Sanpault).

II. — *Dyspepsie hyperthénique* (hyperacidité, hyperchlorhydrie) :

Lorsqu'il y a douleur donner l'une des poudres suivantes à l'apparition de la douleur.

- 1° Bicarbonate de soude..... 1 gramme.
Craie préparée..... 0 gr. 25 centigr.

Cinq à dix par jour.

- 3° Bicarbonate de soude..... }
Craie préparée..... }
Phosphate de chaux..... } à à 0 gr. 25 centigr.
Magnésie hydratée..... }

Cinq à dix par jour.

- 4° Bicarbonate de soude..... 0 gr. 75 centigr.
Craie préparée ou magnésie calcinée..... 0 gr. 25 —
Poudre de belladone..... 0 gr. 02 —

Un cachet de 2 hrs en 2 hrs ou de 3 hrs en 3 hrs. suivant l'effet (d'après Biret).
ou bien donner l'un des paquets suivants :

- 1° Bicarbonate de soude..... }
S. nitrate de bismuth..... } à à 1 gramme
Magnésie hydratée..... }
Craie préparée..... }

Prendre un paquet dans un verre d'eau de Vichy, après les repas au moment des douleurs.

(1) Le sel est mal supporté par certains malades, si ces poudres provoquent le vomissement, il faudra le supprimer dans les poudres suivantes.