


SI VOUS NEGLIGEZ VOS OREILLES, VOUS POUVEZ EN MOURIR




Nous ne prêtons jamais assez d'attention aux oreilles et c'est précisément parce qu'elles nous causent rarement du trouble que nous en prenons peu de soins, quoiqu'elles méritent une attention toute spéciale. C'est grâce au peu de soins que nous donnons à cette partie si délicate et si fragile de notre organisme que l'on voit augmenter d'une façon si effrayante le nombre des décès, les maladies et les cas de surdité complète.

Une des principales causes des maladies des oreilles, c'est la pratique habituelle que l'on a d'injecter dans les oreilles de l'eau chaude ou du lait comme désinfectants, au moindre épanchement un peu abondant de cérumen dans le conduit externe. Le cérumen est une substance visqueuse et épaisse sécrétée par les glandes de l'oreille dans son conduit intérieur, et l'épanchement du cérumen est appelé communément la suppuration des oreilles. Cette suppuration est surtout abondante chez les enfants mais quelquefois aussi chez les grandes personnes.

La cause habituelle de cette suppuration est une infection dans la gorge ou le pharynx et qui, à travers la trompe d'Eustache atteint l'oreille moyenne et y cause une inflammation. Le pus s'accumule dans ce conduit et finalement filtre à travers le tympan de l'oreille pour s'écouler plus ou moins abondamment dans le conduit externe.

Si lors de ces épanchements l'oreille est lavée intérieurement par une personne autre qu'un médecin ou une infirmière compétente, il y a un grand danger pour que le liquide injecté le soit avec une force trop grande qui le force à pénétrer jusque dans l'oreille interne en perforant le tympan.

Cette perforation du tympan peut donner naissance à la maladie connue sous le nom de "mastôidite" qui est une inflammation très douloureuse des



Croquis montrant le point de départ de beaucoup de maladies dans les oreilles.

A—Os du Crâne.

B—Partie à travers laquelle l'infection peut passer pour gagner les cellules mastoïdiennes.

C—Oreille moyenne qui peut être atteinte par le liquide injecté quand la membrane du tympan est perforée.

D—Conduit externe de l'oreille.
E—Trompe d'Eustache à travers laquelle l'infection passe de la gorge et du pharynx dans l'oreille.

F—Cellules mastoïdiennes, dont l'inflammation peut causer la surdité ou nécessiter l'opération de la trépanation.