

6. Anatomie pathologique : Letulle, 7 rue de Magdebourg.
7. Pathologie interne : Rendu, 28 rue de l'Université ; F. Vidal, 155 boulevard Haussmann.
8. Médecine de l'Enfance : Marfan, 30 rue de la Boétie.
9. Thérapeutique : Gilbert, 27 rue de Rome.
10. Pharmacologie, Chassevant, 70 rue de Rennes.
11. Matière médicale : Chassevant, 70, rue de Rennes.
12. Neurologie : P. Marie, 3 rue de Cambacérès.
13. Psychiatrie : Ant. Ritti, Asile de Charenton, Seine.
14. Dermatologie et Syphiligraphie : G. Thibierge, 7 rue de Surennes.
15. Chirurgie générale : Walther, 21, boulevard Haussmann.
16. Chirurgie de l'Enfance : A. Broed, rue de l'Université ; Villemin, 58 rue de Notre-Dame-des-Champs.
17. Chirurgie urinaire : Desnos, 31 rue de Rome.
18. Ophthalmologie : Parent, 26 avenue de l'Opéra.
19. Laryngologie, Rhinologie : Lermoyez, 20 bis rue de la Boétie.
20. Otologie : Castex.
21. Stomatologie : Dr Ferrier, 22, rue Boissy d'Anglas.
22. Obstétrique : Dr Champetier 28, rue de l'Université.
23. Gynécologie : Dr Hartman, 4, Place Malesherbes.
24. Médecine légale : Dr Mottet, 161, rue de Charrol. Dr Thoinot, 8 rue de l'Odéon.
25. Médecine et chirurgie militaires, M. Catteau, au ministère de la guerre.
26. Médecine navale : M. Langier, ministère de la marine.
27. Médecine coloniale : M. Kermorgant, ministères des colonies.

NOTES DIVERSES

A. Martin. Les suites de l'ovariotomie.— Sous ce titre, l'auteur étudie les complications tardives qui peuvent survenir chez les ovariectomisées, à savoir la distension de la cicatrice, une hernie secondaire et des troubles généraux résultat du défaut de sécrétion interne des ovaires enlevée au cours de l'opération.

Pour ce qui est de la distension de la cicatrice, un ancien travail d'Abel a montré, qu'avec l'asepsie et la suture à étages, le nombre des hernies secondaires a considérablement diminué. Le même fait ressort aussi de la statistique personnelle de M. Martin.

Ainsi, sur 350 ovariectomies faites jusqu'en 1895 chez des malades ayant pu être suivies, les cicatrices défectueuses furent trouvées dans 41 pour 100 des cas ; et sur ce nombre, la moitié