

Après 135 cas dernièrement observés, l'auteur est arrivé à cette conviction qu'il est inexact de croire que le traitement expectant est moins dangereux que le traitement opératoire. Sur 24 cas ainsi traités, il y a eu 2 cas de mort, ce qui donne une mortalité de 8 p. 100 chez des femmes qui, malgré une expectation dirigée suivant toutes les règles, ont eu cependant des hémorragies intrapéritonéales graves et subites, de sorte que l'opération pratiquée immédiatement ne peut sauver les malades d'une mort par hémorragie. Par contre, sur 111 cas traités par l'opération, 4 femmes seulement sont mortes, de sorte que l'opération faite en temps voulu est moins dangereuse que la simple expectation. Mais on ne peut douter, en cas d'absence d'hémorragies graves, de la possibilité de la guérison spontanée du processus. Toutefois, les malades sont incapables de travailler pendant plusieurs mois et restent dans les premiers temps sous la menace d'une hémorragie mortelle.

Pleurésie purulente; vomique suivie de septicémie pleurotomie suivie de guérison

PAR M. LE DOCTEUR BROCA

A juste titre, la pleurésie purulente à pneumocoque a réputation relativement assez bonne, et de fait quand elle est onérée à temps et bien, elle a coutume de guérir vite et radicalement. Mais parfois on a voulu aller plus loin et soutenir que volontiers elle guérit d'elle-même, ou à peu près, le pus ayant été évacué par simple ponction ou, spontanément par vomique. De la ponction, je ne vous parlerai pas aujourd'hui, sauf pour vous conseiller en passant de ne pas trop vous y fier, et il ne va être question que de la vomique, à propos de l'enfant qui sort aujourd'hui de notre service, après y avoir été admise dans un état presque désespéré.