

et l'étendue de l'infection. On se guidera pour cela sur l'état général et surtout sur l'état local. Si la poche des eaux n'a pas été rompue, s'il n'y a aucun écoulement vaginal ou que cet écoulement soit insignifiant et sans odeur, si le ventre est souple sans défense et que la sensibilité soit bien localisée à l'utérus, une application de glace sur le ventre ou si elle est mal supportée des applications chaudes, 1-4 de grain de morphine sous la peau et des lavages vaginaux tièdes, car trop chauds ils provoqueraient l'avortement, permettront d'attendre les événements, si les intestins le demandent un lavement et au besoin un purgatif salin pourront être ordonnés. Dans bien des cas tout rentrera dans l'ordre et la grossesse continuera son cours. Si la poche des eaux a été crevée, il ne faudra pas en tirer comme conclusion que l'avortement étant inévitable, il est préférable de le pratiquer aux premiers signes d'infection. Bien au contraire on mettra tout en œuvre pour le retarder si on pense que l'infection peut encore être jugulée. Maintenir l'organe au repos, soutenir le cœur, faire travailler les reins constitueront les trois bases stratégiques sur lesquelles le médecin devra s'appuyer au cours de la bataille engagée contre l'infection et ses armes seront l'opium, la strychnine et un diurétique tel que la lactose (30 gr. pour 1000) la crème de tarte (1 dr. à la pinte) ou une eau minérale essentiellement active telle que l'eau de la Preste. J'ai dit que le curettage était dangereux parce qu'il crée une plaie en plein milieu infecté, il est à redouter pour une autre raison de non moindre importance: savoir que l'avortement criminel étant généralement pratiqué entre le deuxième et le quatrième mois, il coïncide précisément avec l'époque où le curettage de l'utérus gravide donne lieu aux hémorragies les plus abondantes et les plus difficiles à contrôler; sans parler de la friabilité de la paroi utérine que la curette a tôt fait de transpercer même entre les mains les plus habiles.

Il est évident que durant cette expectative armée on ne perdra pour un instant de vue que le grand danger est l'extension

de l'infection au péritoine et que la fusée se fera dans la majorité des cas par les trompes. Ce sont donc elles, elles et la feuille de température qu'il faudra surveiller de près, car si il est dangereux d'intervenir trop tôt il est au moins aussi dangereux de le faire trop tard. Je poserais donc comme ligne de conduite générale, n'ayant d'ailleurs rien d'absolu, que si dans les 48 à 56 premières heures de votre traitement d'attente l'infection au lieu de regresser ou de demeurer stationnaire semble vouloir gagner la main il faut tenter la chance: dilater largement le col écouvillonner l'utérus et le laver. Et les signes qui vous détermineront à agir seront: localement la sensibilité de chaque côté de l'utérus au niveau des ligaments larges, s'accompagnant d'un peu de défense de la paroi qui sent l'ennemi venir; au point de vue général l'accélération du pouls et surtout deux signes sur lesquels j'attire votre attention, l'accélération des mouvements respiratoires et l'agitation de votre malade malgré la morphine. Dans ce combat contre l'infection péritonéale la morphine que les anglais en général rejette et sous prétexte qu'elle masque les symptômes, est pour moi au contraire le médicament par excellence, la pierre de touche qui m'a permis, dans bien des cas, de juger d'emblée une situation, car la morphine donnée en 1-4 de grains n'a jamais calmé une malade dont le péritoine est en jeu.

Si la poche des eaux a été rompue et que le placenta reste seul ou partie de ce placenta, le curettage sera moins à craindre, il sera toujours préférable cependant de le faire quand les signes d'infection auront disparus.

2 — DANS L'AVORTEMENT NON CRIMINEL. — Les causes de l'infection sont dans la majorité des cas sous la dépendance d'une lésion simple ou double des annexes, des trompes en général, foyer souvent ancien d'un incendie, que les adhérences n'avaient pas réussi à étouffer complètement et que le traumat, physiologique de la grossesse a suffi pour rallumer. Dans certains cas elle peut