

- Hæmorrhage during fourth, fifth,
 and sixth months, 345—349
 — in abortion, 319—321
 — in extra-uterine pregnancy,
 331—344
 — in placenta prævia, 359
 — post-partum, 434—446
 — secondary, from funis, 581
 Hæmorrhoids in pregnancy, 271
 Heart, foetal, auscultation of, 69,
 97
 — — as indication for forceps,
 511
 Hebotomy, *vide* Pubiotomy.
 Hegar's sign of pregnancy, 100,
 101
 Hermetic bandage of eyes, 583
 History of patient, 48—49
 Humanised milk, 565, 566
 Hydatidiform or vesicular mole,
 279—283
 Hydræmia of pregnancy, 270
 Hydramnios, 283—285
 Hydrastis Canadensis in abortion,
 319
 Hydrencephalocoele, 424—426
 Hydrocephalus, 424—426
 Hydromeningocoele, 424—426
 Hydrorrhœa gravidarum, 274—278
 Hygroma, cystic, 425
 Hydrogen peroxide in puerperal
 sepsis, 467
 Hyperemesis gravidarum, 298—
 300
 Hypertrophy of cervix in preg-
 nancy, 293
 Hysterectomy, 539
 — in pyremia, 482
 Icterus neonatorum, 580, 581
 Impacted breech, 532—534
 — shoulders, 423
 Inanition fever, 570
 Incarceration of pregnant uterus,
 290—293
 Inclined planes of pelvis, 13
 Incomplete abortion, 321, 322
 Incontinence of urine in pregnancy,
 268, 269
 Induction of abortion, 319—322,
 504
 — — in hydatidiform mole, 282
 — — in hyperemesis, 300
 — — in incarcerated uterus, 292
 — premature labour, 505—508
 — — in contracted pelvis, 403,
 405
 — — in eclampsia, 313
 — — in hydramnios, 285
 — — time at which to induce,
 407—409
 Inertia uteri, 366—369
 Infant feeding, 561—571
 Infusion, intra-venous, in hæmor-
 rhage, 443—445
 Injections, prophylactic, 6—8
 — vaginal, in labour, 7—8
 Insanity, puerperal, 493—496
 Insertio velamentosa, 287
 Inspection of patient, 49, 50
 Internal version, 526—531
 Interstitial mastitis, 488—490
 Inversio uteri, 449, 450
 Involution of uterus, 254, 255
 Ischuria paradoxa, 291
 Jacquemin's sign of pregnancy, 98
 Jaundice in the new-born, 580, 581
 Jelly of Wharton, 30
 Justo-minor pelvis, 373, 375—377
 Knee presentation, diagnosis of,
 65, 225