

Au nombre des méthodes conservatrices déjà dites, nous tiendrions à ajouter

La Méthode de Bier

déjà en usage en Allemagne depuis quelques années. (1) Elle consiste dans une "hyperémie" produite autour du foyer tuberculeux par une compression méthodique. En voici par exemple l'application pour le genou, qui, avec la cheville et le coude, semble l'articulation où ce procédé a donné ses meilleurs résultats. Un bandage de flanelle est appliqué des orteilles jusqu'au plateau tibial. Au-dessus du genou, quelques tours de gaze pour protéger la peau et par-dessus on applique la "bande d'Esmarch". Il sera bon de varier l'endroit où le caoutchouc sera enroulé et de le mettre à des hauteurs alternantes afin que la compression ne produise pas de mauvais effets sur les tissus sous-jacents. Bientôt il se produit un gonflement de l'articulation : ayons soin de ne pas le laisser trop s'accroître et à cet effet il faudra varier le degré de compression. Le but cherché est une "congestion veineuse" locale : rien de plus.

Après expérience personnelle dans son service, Schede a trouvé que parmi les premiers effets de ce traitement il fallait noter la disparition des douleurs chez un très grand nombre de cas ; qu'en plus et surtout il était un adjuvant important aux autres méthodes conservatrices, surtout aux injections iodoformées.

Gerulanos, (2) dans une étude sur le traitement des cas de tuberculose osseuse traités de 1890 à 1895 à l'hôpital de Sainte-Hedwige de Berlin, note les mêmes bons résultats et dit de même que dans $\frac{2}{3}$ des cas auxquels la congestion veineuse fut appliquée, la douleur disparut.

Il nous reste à mentionner comme toute dernière nouveauté un traitement proposé par Buchner. On sait l'emploi de l'alcool en applications locales, vanté par Salzwedel, contre les lymphangites, furoncles, etc. Buchner eut l'idée d'employer la même méthode, au cours des arthrites tuberculeuses, pour obtenir une

Hyperémie Artérielle.

C'est le résultat obtenu par Augerer qui a été communiqué au congrès des chirurgiens allemands (3). On employa des compresses

(1) Bier.—Uberein neues verfahren der conserv. Behaud. von Gelenkliber. Centralbl. f. chir. 1892—No. 32.

(2) Gerulanos.—Tuber der Gelenk.—Cent. f. chir. 1896—No 52.

(3) Buchner.—Congrès des naturalistes allemands. Munich, sept. 1899.