

En admettant même que tous ces symptômes caractérisent la syphilis, ne pouvons-nous pas encore supposer que cette néphrite soit due à l'infection secondaire, streptococcique, et staphylococcique ou autres, développée sur des lésions syphilitiques? La suppuration du bubon syphilitique, celle des pustules, est toujours accompagnée d'infection locale secondaire, alors, cette suppuration abondante de longue durée chez notre malade n'a-t-elle pas pu altérer ses reins et les excès d'alcool auxquels il s'est livré compléter l'œuvre de la suppuration dans la production de la néphrite?

Dans l'incertitude où nous sommes sur la nature de cette néphrite, nous prescrivons le traitement ordinaire de la néphrite aiguë non spécifique: Régime lacté absolu, alcalins, purgatifs, ventouses sur la région lombaire. Il se produit aussitôt de l'amélioration: l'œdème diminue, le taux de l'albumine tombe à 7 grammes par jour — s'y maintient durant 10 jours — et remonte de nouveau à 8, 9 et 11 grammes par jour. Nous décidons alors d'employer le traitement mercuriel et d'autant plus volontiers que l'apparition d'une iritis syphilitique de l'œil gauche nous y contraint. Les injections hypodermiques de quatre à six milligrammes de biiodure d'hydrargire, en solution huileuse durant 16 jours, font graduellement disparaître l'œdème, baisser le taux de l'albumine à 8 grammes, 6 grammes, 2 grammes, 1 gramme 7. et 0 gramme 9; en même temps l'iritis s'améliore et disparaît.

Trois jours après sa dernière injection, le 28 mars, le malade sort de l'hôpital et se prépare à retourner dans son pays. Il est bien portant durant trois semaines, lorsqu'une nouvelle iritis suit à l'œil droit, et l'oblige à retarder son départ.

Il entre de nouveau à l'Hôtel-Dieu; ses jambes sont un peu enflées, et ses urines, de quantité normale, contiennent 3 grammes d'albumine par jour. Il subit le même traitement, et après la huitième injection de biiodure, l'iritis s'améliore, l'albumine diminue à 1 gramme 60, 1 gramme, 1 gramme 25, 0 gramme 25. Deux jours après, la 17e injection alors que le traitement avait été suspendu, l'état des yeux s'aggrave, les deux se prennent d'iritis qui disparaît rapidement, avec les