

qu'en altérant plus ou moins la convexité de cet organe, et en laissant une cicatrice qui en trouble la transparence.

5<sup>o</sup>. Malgré les inconvénients optiques et cosmétiques qui résultent de l'excision de l'iris, inconvénients du reste assez légers lorsque cette excision se fait à la partie supérieure, puisque la paupière supérieure recouvre en grande partie le *coloboma artificiel*, il n'en est pas moins vrai que l'iridectomie, outre la grande facilité qu'elle donne à l'expulsion complète de la cataracte, comme je l'ai dit plus haut modifie tellement les conditions de la circulation intra-oculaire que les inflammations ultérieures ne sont plus à craindre comme autrefois.

Si, depuis à peu près un an que l'opération de de Græfe est pratiquée à l'Hôtel-Dieu nous n'avons pas encore perdu un seul œil par inflammation subséquente, nous le devons tout probablement à l'iridectomie.

Je passe maintenant à la description du manuel opératoire, et des précautions qu'il faut prendre pendant ou après l'opération ; car si l'on veut obtenir les résultats qu'on est en droit d'attendre de cette opération, il ne faut négliger aucune des règles qui sont données.

Les instruments nécessaires pour cette opération, sont : un écarteur des paupières, une pince à fixation, un couteau long et effilé, (couteau de DeGræfe), une pince à iris droite ou courbe, une paire de ciseaux fins et coudés, un cystitôme coudé et une curette de caoutchouc.

L'opération se divise en cinq temps : 1<sup>o</sup>. *Incision périphérique*. 2<sup>o</sup>. *Iridectomie*. 3<sup>o</sup>. *Ouverture de la capsule*. 4<sup>o</sup>. *Extraction de la cataracte*. 5<sup>o</sup>. *Évacuation des masses corticales*.

*Premier temps*.—Le malade étant couché sur le dos, à une hauteur qui permet au chirurgien de rester assis, celui-ci se place en arrière de la tête, s'il doit opérer l'œil droit, et en avant si c'est l'œil gauche. Après avoir placé l'écarteur entre les paupières et fixé l'œil un peu en bas au moyen de la pince à fixation, en saisissant un large pli conjonctival près du bord inférieur de la cornée, on ponctionne avec le cou-