

*Douleur.*—La douleur est le phénomène le plus fréquent de l'ulcère de l'estomac. Cependant on ne l'observe pas constamment.

Le moment où se manifeste cette douleur est très-variable. Le plus souvent elle se produit quelque temps après l'ingestion des aliments, surtout lorsque ces dernières sont indigestes. Fréquemment, aussi, elle a lieu alors que l'estomac est vide, ou soi-disant vide d'aliments.

Il faut savoir, en effet, que certains d'entre eux, non encore digérés, restent dans le ventricule bien au-delà du temps attribué à la digestion stomacale.

On a prétendu que cette douleur était occasionnée ou augmentée par l'action du refroidissement, et qu'elle se développait sous l'influence d'une impression morale. Ce sont là des erreurs, car ces causes ne peuvent rien pour le développement d'un phénomène d'ordre purement local et physique.

On a dit encore que la douleur était augmentée par la pression. Rien de moins juste, car une pression douce et étendue soulage souvent cette souffrance gastrique, ainsi que cela a lieu également pour la gastralgie.

La douleur est paroxystique. Elle se produit quelquefois trois ou quatre fois par jour, et peut faire défaut pendant des semaines et même pendant des mois.

On a prétendu que sa production, ses paroxysmes étaient en rapport avec une extension de l'ulcère. Rien n'est moins exact. On a vu, à l'autopsie de très-petits ulcères chez des sujets qui, avaient été éprouvés par de violentes douleurs, et des ulcères très-étendus, chez des malades qui n'avaient nullement souffert.

Quelle est la cause, quel est le siège de la douleur? Deux ordres de causes peuvent être invoqués. Il est manifeste quelle est due à l'action du suc gastrique sur les ramifications plus ou moins dénudées du nerf pneumo-gastrique; mais on doit faire intervenir aussi, dans une certaine part, une contraction des muscles, une sorte de crampe qui se propage aux nerfs moteurs.

La douleur a deux lieux d'élection; la région épigastrique et la région rachidienne dorso-lombaire. Il est manifeste que cette douleur ne siège pas à l'estomac lui-même, car souvent elle se produit à l'épigastre, et l'on sait que, dans les quatre cinquièmes des cas, le lieu d'élection de l'ulcère est à la paroi postérieure du ventricule. Il ne faut voir dans ce phénomène qu'une action réflexe. Il y a, de la part du pneumo-gastrique, une réaction sur la moelle épinière, qui renvoie ensuite des irradiations douloureuses. Il se produit, en pareil cas, un phénomène analogue à celui qui s'observe dans la pneumonie du