

même *bleu cicatriciel*, qui résume la presque totalité des fractures de la mâchoire inférieure.

Les fractures de la mâchoire inférieure ont des conséquences graves, par le fait qu'elles sont *ouvertes*, leur réparation dépend de la réparation des parties voisines: la peau et la muqueuse. Par le fait qu'elles sont *comminutives*, elles laissent pendant longtemps s'échapper du foyer des esquilles et des séquestres.

Les fractures de la mâchoire inférieure sont fatalement vouées à ce terme de leur évolution: *l'absence de formation d'os*.

Les fractures comminutives de la mâchoire inférieure ne se réunissent pas *par un os*: nous n'entendons pas par là qu'il soit impossible qu'une fracture comminutive fasse *de la consolidation* et même de la consolidation dans laquelle il entre de l'os; mais c'est du tissu fibreux qui s'est interposé entre les deux fragments, c'est un *cal fibreux*.

Ces cals fibreux de la mâchoire inférieure donnent quelquefois des *nappes osseuses* qui s'organisent, s'étendent, s'épaississent pour ainsi dire dans le cal.

Ils proviennent presque toujours de jetées osseuses, d'aiguilles osseuses qui ont été projetées par le traumatisme entre les deux fragments, *tenant à l'un d'eux pendant un certain temps* et finissant par s'organiser.

On a vu des planchers de la bouche presque transformés en os.

La seule condition qui permette à l'os d'apparaître dans le cal de ces fractures, est ce fait que l'os provient de jetées osseuses, de fragments d'os, qui n'ont été compris dans le désastre, qui ne sont pas éliminés comme esquilles primaires, secondaires, comme séquestres. Ces îlots osseux donnent de la consistance au cal fibreux et lui permettent une plus grande résistance dynamique.

Ainsi est-il recommandé d'en favoriser le développement; pour cela, il ne faut pas faire de enretage primitif. On peut enreter le foyer, afin de ne pas laisser le malade s'infecter, mais il ne faut pas toucher aux esquilles; s'il y en a une de tout à fait libre, on peut l'enlever; mais il vaudrait même mieux la laisser.

L'esquille est le seul espoir de voir s'établir plus tard le cal osseux. Une des conditions qui permet la constitution ou la transformation osseuse ou la formation d'os dans ces cals qui malgré tout restent *des blocs des cals fibreux*, c'est l'immobilisation primitive de la fracture.