

tenant aux Coléoptères (*Necrophorus*, *Silpha*, *Hister* et *Saprinus*), ainsi qu'aux Diptères (*Opyra*, *Thyreophora*, *Phora* et *Lonchea*). La période suivante est celle où les tissus subissent de la momification et sont envahis par les Acariens, dont les débris et les excréments se déposent sous forme de poussière. Subséquentement, à mesure que les tissus se dessèchent, apparaît une seconde génération d'*Aglossa* avec aussi le *Dermestes Tineola* et les Coléoptères *Attagenus* et *Anthrenus*. Finalement, quand il ne reste plus du cadavre que les téguments desséchés, deux formes de coléoptères apparaissent pour les ronger, ce sont le *Tenebrio* et le *Pinus*.

Dans le cas de cadavres inhumés, la faune est beaucoup moins variée, elle consisterait simplement dans le *Phora* et l'*Ophyra* des Diptères et le *Philonthus* et le *Rhizophagus* des Coléoptères avec ceux des Diptères qui ont pu envahir le cadavre avant son inhumation.

FAUNE DES CADAVRES EXPOSÉS A L'AIR (1) (COMPILÉ D'APRÈS MÉGNIN)

PERIODES	ETAT DU CADAVRE	DURÉE MINIMA	ESPÈCES
Première période	Cadavres frais	Premiers	(D) Musca *
Deuxième période	Commencement de la putréfaction	trois mois	Cyrtoneura *
			Calliphora *
			(D) Lucilia *
			Sarcophaga *
Troisième période	Acides gras	3 mois	(L) Dermestes *
		à	Aglossa
Quatrième période	Fermentation caséique	4 mois	Pyrophila *
			Anthomya
			(C) Necrobia (Coryntes)
Cinquième période	Fermentation ammoniacale	De 4 mois	(D) Thyreophora
		à	Ophyra *
		8 mois	Lonchea, Phora
			(C) Necrophorus
			Silpha *
			Hister *
			Saprinus *
Sixième période	Dessiccation	De 6 mois	(A) Uropoda
		à	Trachynotus
		12 mois	Tyroglyphus *
			Glyciphagus
			Serator
Septième période	Dessiccation extrême	1 an	(L) Aglossa
		à	tineola
		3 ans	Attagenus
			Anthrenus
Huitième période	Débris	Plus de 3 ans	(C) Tenebrio
			Pinus

(1) (D) Diptère, (C) Coléoptère, (L) Lépidoptère, (A) Acariens, (T) Thysanura.