

tion est disparue, même lorsque l'abcès semblait inévitable.—*Lancette de Londres.*

REMÈDE CONTRE LA TEIGNE.—Le remède du professeur Michelachi contre la teigne est des plus simples: c'est le sel marin qu'il applique topiquement en poudre. Chargé de rechercher les conditions de développement de la maladie en Toscane, pour répondre à l'enquête universelle faite à cet égard par l'administration de l'Assistance publique de Paris, il a remarqué que les habitants des côtes, et en particulier les marins, en étaient exempts. Attribuant cette immunité à l'action du chlorure de sodium, il a soumis 40 teigneux à l'emploi topique de ce sel, lesquels furent guéris en quinze jours, ce qui vient à l'appui de ce que Méral et Delens, Roche, Syerlachi et Richter ont dit à ce sujet dans leurs ouvrages. La relation de ces expériences avec la présentation des malades à l'appui, ont eu lieu à l'*Academia medico-fisica Fiorentina*. C'est un remède simple à conseiller aux mères de famille,—(*Union Médicale*.)

BELLADONE DANS LA HERNIE ÉTRANGLÉE.—A une assemblée de l'Académie Française le 16 Octobre dernier M. Velpeau a présenté un travail de M. Chrestien de Montpellier, sur "la meilleure manière d'employer la Belladone dans la Hernie étranglée." M. Chrestien persiste à croire que la meilleure manière d'employer la Belladone dans ces cas là, est d'appliquer l'extrait aqueux directement sur la tumeur herniaire. Il recouvre la tumeur avec un onguent de parties égales d'extrait aqueux et d'axonge, et il applique pardessus un cataplasme de graine de Lin et des feuilles de Belladone sèches. Après quelques heures les symptômes de strangulation commencent à diminuer et le patient éprouve bientôt ce *gargouillement* particulier qui indique la réduction de la Hernie.

M. Colin prétend que la force impulsive du ventricule gauche du cœur est quatre fois plus grande que celle du ventricule droit.

ABSENCE DU VAGIN.—Une jeune Irlandaise

âgée de 22 ans d'une constitution pléthorique fut consulter le Dr. Collins sur ce qu'elle n'avait jamais été menstruée. Elle dit avoir toujours joui d'une santé parfaite, quoique tous les mois elle ressentait un léger mal de tête et quelques douleurs dans les jambes et les reins, qui disparaissaient généralement en quelques jours. Le Dr. C... supposant qu'il y eut quelque anomalie dans les organes sexuels fit un examen et constata l'absence complète du vagin. Les organes externes étaient très petits. L'ouverture de la vessie était au lieu ordinaire, et il y avait un petit sillon au bas du méat, qui indiquait le lieu de l'os *externum*, mais il n'y avait rien de plus qui put indiquer l'existence d'un canal. En introduisant un cathéter dans la vessie et un doigt dans le rectum on ne sentait que les parois recto-vésicales. On put constater aussi la présence de l'utérus et la femme éprouvait des désirs sexuels naturels. Le cas fut jugé irrémédiable. — (*Boston Medical and Surgical Journal*.)

ANATOMIE DE L'ŒIL.—A une des dernières assemblées de l'Académie des Sciences M. Donsmain a lu un travail sur l'anatomie de l'œil. Contrairement à l'opinion de la plupart des anatomistes, l'écrivain considère que la capsule du cristallin offre la même épaisseur antérieurement que postérieurement. Le ligament suspensoire du cristallin n'existe pas, ce que l'on a pris pour un ligament étant simplement l'union de l'enveloppe commune avec le sac hyaloïde. Il décrit la zonule de Zinn comme étant composée de 4 couches distinctes, et il nie l'existence de la chambre postérieure et du canal de Petit.

PERCHLORURE DE FER.—M. Bitot considère le perchlorure de Fer comme un spécifique dans les affections cancéreuses, comparant son action à celle de l'iode dans la scrofule, et il suggère que le Perchlorure de Fer doit être employé à l'extérieur et à l'intérieur afin d'affecter la diathèse et les parties malades.

Le "Journal de Médecine" de Bruxelles rapporte un cas très intéressant de Tétanos