ence de l'orge est en épi comme celle du blé. Elle
ier en ce que ses glumes sté. es sont plus étroites.
ctées à cause de leur forme mince et allongée qui
etite barbe. Chaque épillet ne contient qu'un seul
variétés ordinaires la glume y est adhérente. Il
3 épillets par coche de l'axe dans l'épi. La barbe
es pointes très fines qui rendent le maniement de
et difficile.

ssemble au blé dans son apparence générale, mais
st un épi plus petit que la moyenne des variétés
qu'il a de développer 4 racines temporaires, au
rise des autres espèces de céréales. C'est d'ail-
ularité qu'on attribue sa résistance plus grande
ux. Sa tige est en général beaucoup plus longue
lle des autres céréales.

disposition des fleurs sur l'avoine est absolu-
rois espèces précédentes. Au lieu d'être collé
aque épillet est disposé au bout d'une petite pé-
longue qui donne à l'avoine une apparence dé-
nflorescence s'appelle "panicule". Les glumes
ngues et plus légères que les glumes fertiles.
ent l'amande du grain enfermée dans leur en-
ois y être attachées, comme dans le cas de

ble, les différentes espèces de céréales ne va-
Leurs habitudes de croissance et la structure
ndent bien souvent difficiles à différencier.
uelques particularités, la manière de les culti-
blable.