

L'ECZÉMA DE L'OREILLE.

Dr L. O. GAUTHIER,

Oculiste et oto-rhino-laryngologiste de l'Hôpital St-François d'Assise.

L'oreille est un lieu d'élection pour l'eczéma qui s'y présente sous deux formes, la forme aiguë et la forme chronique.

L'eczéma aigu atteint soit le conduit auditif externe, soit, le pavillon de l'oreille, soit les deux simultanément. Son étiologie est l'étiologie habituelle des éruptions eczémateuses, à savoir : une prédisposition générale avec ou sans causes locales occasionnelles. Les causes locales occasionnelles sont intéressantes à connaître. Ce sont tous les processus d'irritation du conduit auditif, le grattage, les nettoyages intempestifs, le contact de substances irritantes versées dans l'oreille dans un but quelconque (éther, acide phénique, antiseptiques), le contact surtout de la sécrétion purulente d'une otorrhée. Le pus d'une otite moyenne chronique, en venant baigner constamment le conduit peut, chez les sujets à tempérament apte à faire de l'eczéma, déterminer une éruption eczémateuse aiguë qu'il est important de ne pas considérer comme essentielle. Aussi convient-il de toujours rechercher la possibilité de l'une ou l'autre de ces causes occasionnelles en présence d'une éruption eczémateuse de l'oreille.

L'eczéma aigu de l'oreille détermine des symptômes subjectifs : démangeaisons, douleurs, et des signes objectifs : rougeur, tuméfaction, éruption vésiculeuse, sécrétion. Les démangeaisons assez vives au début, se montrent par accès.

Les phénomènes douloureux consistent non en douleurs proprement dites, mais en une sensation de chaleur, de cuisson, de tension pénible de la peau, que le malade sent gonflée et chaude.

La rougeur offre parfois, surtout au niveau du pavillon, une teinte violacée.

La tuméfaction intéresse le conduit sur toutes ses parois. Il en résulte une abstriction, un rétrécissement de ce conduit dont la lumière se trouve réduite souvent à un tel degré que l'on peut à peine y passer un stylet. Au pavillon, la tuméfaction frappe également les deux faces pour s'étendre dans le sillon rétro-auriculaire jusque sur la peau que recouvre l'apophyse mastoïde.

L'éruption vésiculeuse est éphémère et l'on a rarement l'occasion de l'observer à la période d'état. Elle laisse à sa suite une sécrétion claire, gommeuse, abondante et prolongée, particulière à l'eczéma.