

Il y a des patients qui ont pu, immédiatement après l'opération, reprendre des occupations pénibles.

Avec l'opération se termine le traitement ; aucune manœuvre ultérieure ne doit le compléter. Le cathétérisme, que j'ai toujours vu pratiquer immédiatement après les séances de galvano-caustique, n'avait d'autre but que de faire constater les résultats obtenus.

1^{ère}. Observation. A., 46 ans, tailleur de pierre.—Bonne constitution, 2 blennorrhagies ; l'une en 1861 et l'autre en 1870.—S'est présenté à la clinique de M. le Dr. Mallez, le 7 Août 1873.—Rétrécissement spongieux avec une bride en avant du rétrécissement.—La stricture n'admet qu'une bougie No. 5 ; et encore est-elle d'une difficile introduction et fortement retenue.—M. Mallez le soumet à une séance de galvano-caustique de cinq minutes.—On passe immédiatement la bougie No. 18.—Sept jours après, le malade revient ; on passe facilement la bougie No. 19.

Revu le 29 Août 1873 ; le malade est parfaitement bien.

2^{ème}. Observation. B., 38 ans, plombier.—Il y a dix ans il a eu une blennorrhagie.—Difficulté d'uriner depuis huit ans.—Le 11 Août 1873, il se présente à la clinique de M. Mallez.—Constatacion d'un rétrécissement fibreux.—La bougie No. 8 est introduite, mais difficilement.—Envies fréquentes d'uriner, urines muqueuses, il y a un peu de cystite.—Séance de galvano caustique de huit minutes.—La bougie No. 19 passe librement.

Revu le 1^{er} Septembre 1873 ; on passe facilement les No. 21 et 22.—Le malade allait très bien.

Votre très humble serviteur,

Dr. S. A. LONGTIN.

Paris, 3 Septembre 1873.