

sans contrôle histologique, que les hématoécèles rétro et péri-utérines étaient toutes la conséquence d'avortements et de ruptures tubaires.

N'y a-t-il pas là une exagération? N'est-il pas opportun de rechercher s'il n'existe pas d'autres *causes anatomiques* de ces *hémorragies*? "En effet, à l'heure actuelle, on est moins affirmatif et, à la suite de travaux tout récents, on admet des épanchements sanguins péritonéaux qui ne sont pas dûs à des grossesses tubaires." (Presse Médicale, samedi, 11 mars 1911).

"C'est ainsi que M. de Rouville a publié, l'année dernière, dans les Annales de *Gynécologie*, un cas d'hématoécèle rétro-utérine très considérable, ayant pour origine la rupture d'un kyste hématique de l'ovaire. Depuis lors M. Jayle a publié une série de faits analogues.

Enfin M. Louis Bazy a fait, dans la Revue de *Gynécologie*, une très intéressante étude de la "Salpingite hémorragique" sans grossesse, pouvant donner naissance à une hématoécèle."

"Dans la première des trois observations rapportées, la grossesse tubaire était certaine: le placenta était encore dans la trompe et les recherches microscopiques ont confirmé le diagnostic. Au contraire, dans les deux autres cas, si la grossesse et l'avortement sont certains au point de vue clinique, les recherches microscopiques ont été absolument négatives."

A la dernière séance de la Société Médicale, mardi le 21 mars 1911, je présentais les pièces fraîches d'un hématosalpinx et d'une hématoécèle rétro-utérine, que je venais d'enlever chez une malade, qui avait présenté, depuis deux ans, à la suite d'un accouchement, des symptômes d'infection génitale. Je vous présente ce soir, les préparations histologiques de ces pièces, que le Dr Saint-Pierre a eu la complaisance de préparer pour moi, au laboratoire de l'Hôtel-Dieu.

L'examen histologique de ces préparations démontre, d'une façon évidente, qu'il s'agit bien en effet d'une hémorragie, qui s'est produite par un ulcère rond sur la paroi inférieure de la trompe, dilatée en ampoule, au niveau de son extrémité libre, immédiatement au-dessus de l'origine des franges du pavillon de cette trompe.

L'hémorragie a pour foyer, un ulcère rond, profond, bien vi-