

est encore préférable, car on obtient tout à la fois l'effet vomitif et purgatif.

On a le choix entre les purgatifs, il est cependant bon de prendre l'un des suivants, qui sont cholagogues.

Paquets :

Calomel 0 gr. 25

Rhubarbe 0 — 30

Pour un paquet

On peut aussi donner le calomel à doses fractionnées, sous forme pilulaire :

Pilules :

Extrait de chélidoine..... }
Calomel à la vapeur.... } à 0 gr. 60

Poudre d'iris..... }

Pour 12 pilules — Une toutes les heures. (Liégeois).

Masse pilulaire hydrargyri-

que..... 0 gr. 60

Poudre de Dower..... 0 — 30

Pour 3 pilules — Une toutes les quatre heures.

Ce purgatif donné au début du traitement a l'avantage d'enrayer souvent les accidents gastro-intestinaux et de provoquer un grand soulagement au malade.

Si l'on ne se sert pas du calomel, on donnera des boissons alcalines ; mais si on l'a prescrit, il faut attendre au moins 24 heures pour en faire boire. Le mieux est alors d'en faire prendre le matin vers 10 h. $\frac{1}{2}$ et le soir vers 5 h. un grand verre d'eau de Vichy, d'une source froide, soit Vichy Hauterive, soit Vichy Saint-Yorre. Cette dose peut être dépassée facilement et même doublée, l'eau sera donnée pure ou coupée avec un peu de lait.

L'eau alcaline remplit la double indication d'augmenter la sécrétion biliaire pour chasser ainsi le bouchon muqueux et d'agir sur les voies digestives. Son action peut être aidée par l'usage des laxatifs quotidiens, un demi-verre d'eau de Châtelguyon tous les matins, par exemple.

Le régime alimentaire sera surveillé de près ; le lait y prendra la place principale ; on y ajoutera des potages au lait et aux pâtes alimentaires et des gâteaux aux œufs et au lait. Un peu de viande bien cuite et quelques légumes verts accommodés au lait compléteront plus tard ce régime. Pendant toute la convales-