

Ferme expérimentale centrale, Ottawa.

de manière à être à intervalles d'environ cinq pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 23 mai, et l'arrachage des racines le 23 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.	Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.		
		tonn.	lb.	tonn.			lb.	tonn.	lb.		
	(Cinq ans.)					(Cinq ans.)					
1	Improved Short White	27	758	30	900	4	Ontario Champion	26	602	27	1,100
2	Giant White Vespers	26	1,395	27	1,400	5	White Belgian	20	1,425	21	900
3	Mammoth White Intermediate	26	1,085	20	900	6	Half Long Chantenay	17	1,865	20	1,900

Le rendement moyen des six variétés de carottes à la ferme expérimentale centrale à Ottawa en 1907 a été 24 tonnes 1,517 lb. par acre.

BETTERAVES À SUCRE.

Nous avons en 1907 essayé à Ottawa trois variétés de betteraves à sucre. Elles ont été semées en rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à être à intervalles d'environ cinq pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 23 mai, et l'arrachage des racines le 23 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.	Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.		
		tonn.	lb.				tonn.	lb.			
	(Cinq ans.)	tonn.	lb.	tonn.	lb.		(Cinq ans.)	tonn.	lb.	tonn.	lb.
1	Wanzleben	21	1,509	20	700	3	Vilmorin ancrée	22	1,871	23	1,200
2	Très riche française	23	1,611	21	-						

Le rendement moyen des trois variétés de betteraves à sucre à la ferme expérimentale centrale à Ottawa en 1907 a été 21 tonnes 1,390 livres par acre.

POMMES DE TERRE.

Nous mentionnons ici vingt-huit variétés de pommes de terre cultivées à Ottawa.

Pour le plantage les tubercules ont été coupés en tronçons à trois yeux au moins, et ceux-ci ont été plantés en rangs espacés de deux pieds et demi, les plantons à intervalles d'environ un pied dans les rangs.