

## DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 571

316.  
larice glabris,  
D. f. 3. Morif.
- bpedicellatis,  
ulatis. Hort.  
. Roy. lugd.  
Dalib. paris.  
in. 228.
- rdatis petio-  
ibus ramosis  
iſt. 3. p. 415.  
227.
- bosis, foliis  
cillis diffite  
pica. Barr.  
, flore ce-  
platis ferrata-  
rulescente.
- bus ferrata-  
tus ovatis  
Men-
- Mentha cataria hispanica, olim Sideritis altissima, flore  
albo. Baub. hift. 3. p. 226.  
*Habitat in Hispania.* 2
6. NEPETA floribus sessilibus verticillato-spicatis, verti- *birrhosa*,  
cillis tomento obvolutis. Hort. cliff. 311. Roy. lugd.  
316.  
Horminum spicatum, lavendulae flore & odore. Bocc.  
ficc. 48. t. 25. f. 2.  
*Habitat in Sicilia.*
7. NEPETA floribus sessilibus verticillato-spicatis, bra- *tealis*,  
et eis lanceolatis longitudine calycis, foliis petiolatis.  
Mentha Cataria minor alpina. Baub. pin. 223. prodr.  
110.  
*Habitat in Italia.* D. Ratgeb. 2  
Radix perennis. Caulis pedatis. Folia cordata, obtusa,  
crenata, petiolata. Spicas terminales, verticillata: ver-  
ticilli remoti, sessiles, obvallati bracteis lanceolatis, vi-  
ridibus, lateribus albidiioribus, longitudine calycum,  
acuminatis. Calyces eretti, aequales. Corolla alba.
8. NEPETA floribus spicatis sessilibus, bracteis ovatis *tuberosa*,  
coloratis verticilla excipientibus, foliis sessilibus. Hort.  
cliff. 311. Roy. lugd. 316.  
Nepeta tuberosa spicata hispanica. Bocc. maf. 2. p. 44.  
t. 36. Barr. sc. 1131.  
*Habitat in Hispania, Lusitania.* 2
9. NEPETA foliis lanceolatis, capitulis terminalibus, sta- *virginica*,  
minibus flore longioribus.  
Clinopodium foliis lanceolatis, capitulis terminalibus.  
Hort. cliff. 305. Gron. ving. 65.  
Clinopodium amaraci folio, floribus albis. Pluk. alm.  
110. t. 85. f. 2.  
Clinopodium, flore albo, ramosius, angustioribus foliis  
glabris, virginianum. Morif. hift. 3. p. 374. f. 11. t.  
8. f. ult.  
*Habitat in Virginia.* 2  
*Labium inferius corolla ferratum, ab non concavum.*
10. NEPETA corollarum labio superiore integerrimo *indica*,  
brevisimo.  
Leucas foliis subrotundis serratis, flore albo. Burm.  
xxv. 140. t. 63. an?  
Nepeta indica, rotundicre folio. Morif. hift. 3. p. 415.  
f. 11. t. 6. f. 7.