

Congestions et Troubles fonctionnels du Foie

Coliques hépatiques

Ictère

TITRES de GRANULES d'origine paludéenne

et consécutive au long séjour dans les pays chauds.

POSOLOGIE: Chaque granule est rigoureusement titré à 1 milligr DOSE: 6 à 8 Granules par jour.

DEPOT : A. HOUDÉ, 29, Rue Albouy, PARIS. - DETAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies.

BOLDOINE EPARVIER

NOUVEAU SPECIFIQUE DES AFFECTIONS DU Foie, DES Reins, DE l'Estomac

Granulee - Non Alcolique - Soluble

ATONIE DES ORGANES DIGESTIFS. DYSPÉPSIES

STIMULANT. TONIQUE GENERAL, SANS ACTION SUR LE COEUR

Contient tous les Principes du Boldo Frais, y compris L.A. PARTIE AROMATIQUE DOSE 4 DEUX À QUATRE CUILLÉRÉES À CAFÉ PAR JOUR, À LA FIN DE CHAQUE REPAS

E<u>PARVIER</u> (CASCARA EPARVIER)

Prescrites avec un succès constant par le Corps Médical depuis plus de vingt ans dans tous les cas de CONSTIPATION - Atonie intestinale - Hémorrhoïdes - Jaunisse - Grossesse - Allaitement. Pas de Congestion, pas de Coliques, pas de Diarrhée, pas d'Accoutumance. DOSE : UNE PILULE chaque soir au repas

ECHANTILLONS GRATUITS DE CES PRODUITS SUR PHARMACIE DECARY RUE STE-CATHERINE

S DE LA G

Laryngites, Pharyngites, Amygdalites

Angines, Diphtérie

Toux nerveuses

Picotements

à la STOVAÏNE *POSOLOGIE :*

Chaque Pastille renferme exactement 3 milligrammes de principe actif.

DOSE: 6 à 12 par jour suivant l'age, à préndre consécutivement.

DEPOT: A. HOUDE, 9, Rue Dieu, PARIS. DETAIL: Dans toutes les bonnes Pharmacies.

N'a pas d'égal comme nutritif et reconstituant pour enfants et adultes

Parmi les nombreux médica-

ments pour l'Anémie, la Débilité

31,56 p.c. Heamoglobin-Albumen

Nerveuse, la Lassitude, etc.

ANALYSE: 25 Octobre 1904.

HAEMATOGEN Marque "ROLAND" contient ; 40,56 p.c. d'extrait, 5,05 p.c. Nitrogen, 31,56 p.c Albumen, 9,00p.c Extrait moins Albumen.

(Signé) Dr ALEX, analyste certifié.

Rien autre que L'HAEMOGLOBIN pu. et non-diluee qui contient les propriétés actives médicinales du fer, du phosphore, et du souffre, en combi-naison naturelle organique, renforcit et stimule.

DIRECTIONS:

ENFANTS: 1 à 2 cuillérées à thé, selon l'âge, trois fois par jour. ADULTES: Une cuillèrée à table trois fois par jour. A prendre après les principaux repas dans de l'eau froide, du cocoa ou du vln.