

Exploration trimanuelle, l'utérus étant en prolapsus artificielle.— Au moyen d'une pince de Museux, on attire l'utérus de façon à apercevoir le col à l'orifice vaginal, et l'on confie cette pince à un aide. L'opérateur pratique alors l'examen à l'aide d'un doigt introduit dans le rectum et d'une main placée sur la paroi abdominale.

La facilité avec laquelle on atteint l'utérus et les annexes est bien plus grande qu'avec les autres méthodes.

Pour ne pas avoir recours à un aide, on peut tenir la pince fixée entre le pouce et les derniers doigts pendant que l'on explore l'excavation avec l'index.— *Gazette de Gynécologie.*

PÉDIATRIE.

Traitement local de l'incontinence d'urine chez les enfants, par M. Pousson, in *Journal de médecine de Bordeaux.*— L'incontinence d'urine affecte chez les enfants des formes variables. Lorsqu'on pratique chez eux l'examen méthodique des voies urinaires au moyen d'une bougie à boule, on voit qu'ils sont parfois porteurs de lésions fonctionnelles ou organiques en rapport avec les troubles symptomatiques; d'autres fois, on ne trouve aucune lésion. On a pu décrire à l'incontinence d'urine infantile trois formes pathogéniques: 1. La forme par atonie du sphincter; 2. l'irritabilité vésicale de Trousseau, sans aucune altération du sphincter; 3. l'irritabilité de la portion membraneuse de l'urètre ou contracture du sphincter.

Comment expliquer dans ces cas l'incontinence d'urine? L'atonie du sphincter se définit d'elle-même; l'irritabilité vésicale avec intégrité du sphincter, que décrivait Trousseau et qu'il traitait par la belladone, se comprend aisément; mais, dans la contracture du sphincter, l'incontinence d'urine semble paradoxale. M. Janet en donne cette ingénieuse pathogénie: les enfants atteints de cette incontinence d'urine sont des nevropathes, des émotifs, préoccupés tout le jour de leur fonction urinaire, interrompant à chaque instant leurs jeux et travaux pour uriner, polyuriques et pollakiuriques. Cette obsession urinaire ne les quitte pas la nuit: lorsqu'ils dorment profondément, ils rêvent et mêlent à leurs rêves l'envie d'uriner, comme ils la mêlent dans le jour à leur jeux (rêve mictionnel.)

Dans ces diverses formes, les divers traitements médicaux ne sont pas à négliger. Mais quand ils ont échoué, il faut recourir au traitement local, qui agira par excitation sphinctérienne.

L'indication de ce traitement, plausible dans l'atonie sphinctérienne, paraît paradoxale dans la contracture.