

IV. APODES.

Ventrales nulles.

Cet Ordre se borne pour nous à la seule famille qui suit.

Fam. des ANGUILLIDES. *Anguillidæ*.

Corps cylindrique et très allongé, serpentiforme à caillies à peine apparentes, étant englouties dans une peau molle et épaisse. Vessie natatoire de forme variée et souvent singulière.

La chaire huileuse et lourde de ces poissons est rejetée par un bon nombre de personnes, tandis qu'elle est fort estimée par d'autres, tant fraîche que salée ou fumée.

Deux genres dans notre faune.

Dorsale et anale unies à la caudale..... 1. ANGUILLA.

Dorsale et anale séparées de la caudale..... 2. AMMODYTES.

1. Gen. ANGUILLE. *Anguilla*, Cuv.

La dorsale qui commence considérablement en arrière des pectorales, s'unit à l'anale pour former la caudale. Mâchoire inférieure plus longue. Bouche avec un rang de dents à chaque mâchoire et quelques autres sur la partie antérieure du vomer.

Anguille de Boston. *Anguilla Bostoniensis*, DeKay; *Ang. vulgaris*, Mitch.; *A. tenuirostris*, Dek.; *Muræna Bostoniensis*, Lesueur.—Long. 20 à 35 pouces. Brun olive en dessus, jaunâtre ou blanc-jaunâtre en dessous; souvent le bord de la nageoire anale porte une teinte rougeâtre. Dans les individus plus jeunes, les opercules, la gorge et l'abdomen jusqu'à la queue sont d'un ardoisé bleuâtre, avec à peine apparence de jaunâtre. La dorsale est de même couleur que le dos. Corps cylindrique, fortement comprimé à la queue. Tête comprimée en dessus; mâchoire inférieure plus longue. Ligne latérale droite. Pectorales arrondies à l'extrémité et composées de 16 rayons.

L'Anguille se trouve dans les eaux salées, saumâtres et douces. Celles des eaux courantes sont d'ordinaire de meilleure goût que celles qui vivent dans des marais à eau boueuse, elles contractent alors une certaine saveur de