

PSEUDO KYSTE SYNOVIAL DE LA JAMBE

Par **Raymond D'Auteuil**

Assistant à la Clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu du P. S.
et à l'Hôpital Laval.

La Revue d'Orthopédie de septembre 1930 publie sous ce titre une observation de J. Guillot, Interne des Hôpitaux de Paris, observation qui nous intéressa d'autant plus que nous avions justement sous nos soins un cas semblable mais présentant cependant quelques particularités cliniques très intéressantes qui nous amenèrent à consulter la littérature sur cette question.

Le cas de Guillot est rapporté comme suit:

“M. M. . . , 58 ans, entre à la Pitié pour une tuméfaction survenue progressivement depuis 2 ans au niveau de la jambe droite. Au début le malade a constaté cette grosseur indolente du volume d'une noix au niveau de la partie supérieure de la jambe. Puis la tumeur a augmenté de volume au point de déterminer depuis 1 mois des douleurs et de la gêne à la marche.

A l'examen on constate une tuméfaction de la loge antéro-externe de la jambe. Celle-ci, longue d'une dizaine de centimètres, remonte jusqu'à la tête du péroné qui est perceptible. Elle descend jusqu'au tiers moyen de la jambe.

Elle a une forme allongée et ovoïde parallèle à l'axe du membre.

La peau est normale et n'adhère pas à la tumeur.

Par la palpation on perçoit une masse lisse, régulière, à limites imprécises. Sa consistance est dure. Par places il semble qu'elle soit résistante.