

la dernière solution phéniquée.—Sous l'influence de ce traitement, la suppuration est amoindrie, la rougeur des plaies est insignifiante, et les cicatrices sont beaucoup moins apparentes. L'auteur le recommande pour les abcès du sein.—*Le Médecin Praticien.*

Loupes du cuir chevelu ; préférence donnée au traitement par embrocation ou procédé de Jobert: exemples des heureux résultats obtenus par ce moyen.—Jobert de Lamballe opérait les loupes par l'opération qui paraît la plus simple et à laquelle ne manquait que la sécurité. M. Championnière a vu l'érysipèle chez des opérés de Jobert. Il consiste à fendre d'un seul coup de bistouri toute la tumeur, peau et kyste avec une pince et à l'enlever d'un seul coup. Il appelait cela de l'embrochement.

Arrivé à cette conviction que l'érysipèle ni l'infection purulente ne sont à redouter avec le pansement de Lister, M. Championnière a fait de l'opération de Jobert la base de sa pratique, et l'a appliquée déjà un grand nombre de fois. Cette méthode est appelée à rendre les plus grands services, mais à une condition toutefois, c'est qu'on prendra une série de précautions minutieuses pour en assurer la perfection.

Il faut d'abord opérer avec sécurité, puis il faut atteindre la perfection du résultat opératoire, deux choses impossibles avec les vieilles opérations.

S'il s'agit d'un homme et si les tumeurs sont de médiocre volume, les cheveux étant rasés autour de la tumeur ou coupés très courts, on savonne la tête ou on la lave avec l'eau de Panama (*Quilaya saponaria*), puis avec l'eau phéniquée forte. On embroche alors la tumeur à sa base et on la fend d'un seul coup de bistouri, avec deux pinces à griffe ou une pince à dissection et une pince à griffe, on saisit la paroi du kyste et on l'attire à soi; quelques tractions ou quelques coups de spatule suffisent à faire l'énucléation.

Autrefois M. Championnière s'est contenté de ce procédé opératoire, et opéra en 1876, à l'hôpital de Lariboisière, un homme possédant treize loupes en deux séances. L'embrochement terminé, on lava la plaie avec l'eau phéniquée forte, puis on appliqua du protectine sur chaque plaie linéaire, de la gaze phénique par-dessus, et le malade guérit très-vite. Toutes les autres précautions de la méthode de Lister étaient observées.

Mais, pour peu que la loupe ait un certain volume, toute la longueur de l'incision donne une croûte épaisse; la réunion n'est pas exacte. Il s'accumule souvent un peu de sérosité