

qu'il puisse réaliser le traitement abortif de la syphilis. Si l'arsénobenzol est indiqué dans le traitement de la syphilis, c'est tout au plus dans les cas rebelles au mercure. Mais ces cas sont rares; de plus il y a des cas rebelles aux deux remèdes. Enfin, l'administration de l'arsénobenzol présente de nombreux risques et dangers.

La pilocarpine dans le traitement de la diphtérie, par PINEIRO, dans *Gaz des hôpit.*, 27 avril 1911, et *Rép. Méd. Int.*, août 1911.

L'auteur n'entend pas déprécier en quoi que ce soit la méthode sérothérapique, laquelle demeure le procédé de choix; mais on peut se trouver en présence de circonstances empêchant de l'employer en temps opportun. Il est donc logique, en pareil cas, de recourir à la pilocarpine qui a déjà donné de très bons résultats entre les mains de Roger: ce qui est certain, c'est que la pilocarpine provoque la chute des fausses membranes beaucoup plus rapidement que le sérumée. Voici la formule à employer:

Nitrate de pilocarpine.....	0 gr. 05
Eau distillée.....	25 gr.

Un quart de seringue de Pravaz, chargée avec cette solution, représente un demi-milligramme de substance active. C'est la dose à injecter au début; dans les cas graves on pourra aller jusqu'à 3 milligrammes répartis sur les 24 heures. Dans l'appréciation des doses, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant et de l'état de son cœur, afin d'éviter le collapsus.

Pneumonie des vieillards. Traitement par l'injection sous-cutanée d'huile camphrée, par LAFON, Thèse dans *Rép. Méd. International*, août 1911.

I. — Chez le vieillard, la pneumonie, affection dont la fréquence et la gravité augmentent avec l'âge, présente les mêmes symptômes que chez l'adulte.

* Signes d'infection: température élevée, leucocytose, troubles nerveux, etc.

Complications diverses: pleurésie, endo-péricardite, urémie, conséquences de lésions antérieures (mal de Bright) ou d'infections pneumococciques ou polymicrobiennes surajoutées.