

en deux dents, tandis que dans le *femur-rubrum* il est coupé presque droit sans aucune échancrure. La couleur dans l'une et l'autre espèce est fort variable, le brun-pourpre du prothorax se montrant dans quelques individus très obscur, tandis que dans d'autres il passe au rouge-sang. Plusieurs auteurs veulent que ces 2 espèces ne soient qu'une variété l'une de l'autre.

Gen. ACRIDIUM, Geoff. Vol. VIII, p. III.

Au lieu de :

Orignet rugueux. *Acridium rugosum*, spec. nov.; lisez :

Orignet appendiculé. *Acridium appendiculatum*, Uhler.

Gen. ŒDIPODA, Latr. Vol. VIII, p. 112.

Page 114. 4 Œdipode marbré. Nous avons pris une variété de la précédente espèce, *Œd. verruculata*, pour la *marmorata* de Uhler. Remplacez cette description par la suivante :

Œdipode transparent. *Œdipoda (Camnula) pellucida*, Scudder.
—Long. .1.05 pce; extension des ailes .1.90 pce. Brun-cendré; face brun-roussâtre. Antennes jaunâtres à la base, brunes à l'extrémité. Vertex excavé, ses bords relevés, une ligne saillante médiane peu prononcée sur l'occiput. En arrière de l'œil, se voit une tache noire triangulaire dont la pointe touche l'œil même. Prothorax jaunâtre plus ou moins obscur, avec une grande tache noire sur les côtés, la carène médiane interrompue par une seule fissure. Elytres jaunâtres avec de grandes taches brunes prédominant dans la moitié basilaire, l'extrémité étant transparente avec les taches brunes beaucoup plus petites. Ailes transparentes avec les nervures noires, la base lavée de jaune-clair et l'extrémité légèrement obscure. Pattes brunes, les cuisses postérieures jaunâtres avec trois bandes obliques noires ou très foncées, leurs jambes jaunâtres, obscures aux deux extrémités, avec un anneau blanchâtre au dessous de la base.—PC.

Très rapprochée de la *sordida*, mais s'en distinguant surtout par la tache noire en arrière des yeux et par la coloration des élytres, qui dans la *sordida* se dessinent toujours en deux bandes pâles obliques, bien distinctes, embrassant presque entièrement la largeur de l'élytre.

Gen. STENOBOTHRUS, Fisch. Vol. VIII, p. 134.

Ajoutez aux 2 espèces mentionnées :

3. Sténobothre approchant. *Stenobothrus propinquans*, Scudder,