

Pins , chargés de peu de branches et qui se fendent de droit fil , sont préférés aux autres arbres pour former les clôtures des habitations. Malgré la stérilité du terrain où ils croissent , ils sont quelquefois entremêlés de trois espèces de Chênes ; savoir : le *Quercus nigra* , le *Quercus Catesbæi* et le *Quercus obtusiloba*. Le bois des deux premiers n'est bon qu'à brûler, tandis que celui de l'autre est d'un excellent usage , ainsi que je l'ai déjà remarqué.

Les terres à Pins , *Pine barrens* , sont traversées par de petits marais , *Swamps* , au milieu desquels coule ordinairement un ruisseau. Ces swamps , de dix à quarante toises de large ; ont quelquefois plus d'un mille de longueur , et aboutissent à d'autres plus vastes et plus humides qui bordent les rivières. Les uns et les autres ont différens degrés de fertilité assez bien indiqués par les arbres qui y croissent exclusivement et qui ne se retrouvent pas dans le haut pays. Ainsi le Chêne-châtaignier , *Quercus prinus palustris* , le *Magnolia grandiflora* , le *Magnolia tripetala* , le *Nyssa biflora* , &c. ne viennent que dans les swamps de rivières dont le sol est de bonne qualité et constamment frais , humide et ombragé. Dans quelques parties de ces mêmes swamps , qui