

Extrait thébaïque	0.02 gr.
Extrait cannabis indica	0.01 gr.

Pour 1 pilule.

Calmer la douleur et les vomissements.—On y arrive par les alcalins administrés une heure après le repas: les bromures, le cannabis indica, la belladone, la cocaïne et la morphine qui calment la muqueuse et par suite agissent comme modérateurs de la sécrétion. L'eau chloroformée, les lavages de l'estomac avec une eau alcaline, les applications froides au creux épigastrique.

Prévenir l'atonie et la dilatation.—Lorsque l'estomac se dilate par suite d'atonie de la musculature, il se produit habituellement des fermentations qui aggravent encore la dilatation. Il y a presque toujours aussi dilatation et fermentation intestinale. Il faut alors faire l'antisepsie de l'estomac et de l'intestin. Je donne souvent le benzo-naphtol 0.15 à 0.20 en cachets. Il est peu toxique et peu irritant.

Robin donne une cuillère à soupe après chaque repas de:

Eau distillée	300 gr.
Chlorure d'ammonium	1 gr.

Ceci n'agirait pas sur les yimases indispensables à la digestion.

S'il y a douleur, on ajoute un peu de belladone ou d'opium.

Comme le meilleur moyen de réaliser l'antiseptie de l'estomac et de l'intestin est encore l'élimination mécanique, je donne souvent les purgatifs salés d'autant plus que l'on a le plus souvent affaire à des constipés. (Magnésie calcinée, sulfate de soude, nitrate de magnésie).

Le massage de l'estomac et de l'intestin, en même temps qu'il excite la musculature de ces viscères, est d'une heureuse influence sur la sécrétion gastrique qu'il modifie utilement.

Ingram & Bell, Ltd.

Articles pour les hôpitaux et médecins

TORONTO — MONTREAL — CALGARY

Assortiment pour pharmacies et laboratoires

SUCCURSALE A MONTREAL — 160, RUE STANLEY.

Représentant à Québec: GEORGE SAINT PIERRE.

Téléphone: 2-1647

AGENTS CANADIENS: WAPPLER X-RAY CO.—BURDICK CABINET CO.—
HOSPITAL SUPPLY CO., NEW YORK, BRANHALL DEANE CO.