

ans. Cette habitude se rencontre d'ordinaire chez les sujets nerveux, présentant en même temps d'autres tics communs à cette classe. Pour peu qu'on laisse faire, il en résulte de la cachexie, conséquence des mauvaises digestions. Chez d'aucuns, cet appétit dépravé est tenace; il faut les surveiller presque continuellement. Le changement de milieu est quelquefois nécessaire pour réussir.

Si l'enfant souffre de cachexie, on fera bien d'examiner les sels pour y trouver les parasites et les oeufs, source d'infestation, et qui auraient été introduits avec ces substances étrangères.

\* \* \*

Les "*rongeurs d'ongles*" seront traités, en leur coupant les ongles aussi ras que possible, et en leur faisant porter des gants ou des mitaines. Mais j'avoue que chez les enfants âgés, ces moyens ne valent pas grand chose. J'ai présentement à l'esprit le souvenir d'un chantre d'église qui, entre chaque psaume, se rongait les ongles publiquement. Ce n'était pas précisément ce qu'il y avait de plus édifiant.

\* \* \*

Le "*grincement de dents*" est une chose commune chez les enfants, et qu'il est bien difficile d'expliquer. Voici dans quelles conditions cela se rencontre généralement. D'abord chez ceux qui souffrent d'une manière quelconque, de leurs dents, soit à la fin de leur première dentition, soit au début de la seconde. Ensuite et surtout chez les enfants qui ont des troubles gastro-intestinaux. C'est alors un phénomène réflexe.

C'est en effet dans la croyance populaire que grincer des dents indique la présence de vers dans l'intestin. C'est quelquefois vrai; mais, dans la grande majorité des cas, les "*grincheurs*" de dents souffrent de dyspepsie chronique. Ces dyspeptiques sont sujets aux terreurs nocturnes; ils parlent en dormant et même se lèvent.

Il faut aussi savoir que le grincement de dents se rencontre au cours des maladies suivantes: méningite, hydrocéphalie, imbecilité, otorrhée, éneurésis, spasmodie, paralysie infantile, chorée, épilepsie, variole, rhumatisme.

Le traitement de cette affection dépend de la cause.

\* \* \*

Dans la petite et la seconde enfance, il existe chez d'aucuns, certains mouvements oscillatoires et rythmiques de la tête. Les uns se balancent la tête d'un côté et de l'autre. D'autres se frappent la tête contre leur oreiller, ou de leurs mains.

Dans ces cas, il faut voir si l'enfant ne souffre pas de rachitisme, ou bien s'il n'y a pas quelque irritation en quelque part de leur individu, tel que mal d'oreille, mal de dents. Le traitement dans ce cas s'impose.

\* \* \*