

précédent, avait franchi le pylore et se rencontrait à divers endroits du tube intestinal, le plus souvent dans les petits intestins ; 12 ° quelquefois gangrène des intestins.

SYMPTOMES DITS PRÉMONITEURS.—1 ° poids, malaise à l'épigastre, se propageant graduellement à l'abdomen ; 2 ° diarrhée féculente dans le principe et tendant à revêtir le caractère séreux ; 3 ° pesanteur de tête, quelquefois douleur à sa partie antérieure ; 4 ° oppression à la partie inférieure du thorax ; 5 ° éructations acides, et autres symptômes de dyspepsie.

SYMPTOMES CARACTÉRISTIQUES—1RE PÉRIODE.—1 ° Diarrhée séreuse ; 2 ° vomissement séreux ; 3 ° crampes ; 4 ° une soif ardente ne tarde pas à survenir. Généralement, ces deux premiers symptômes se présentent simultanément, et le troisième ne tarde pas à paraître ; mais il arrive très souvent que les deux premiers se succèdent, l'un des deux précédant indifféremment l'autre. Quant au troisième, quelquefois la mort arrive sans sa présence ; dans quelques cas, le vomissement, a-t-on dit, ne survient pas.

Malheureusement faute d'avoir considéré l'un des premiers symptômes, comme indice certain, cette maladie insidieuse (vû que dans son début, elle se manifeste sans grande douleur) n'ayant pas reçu le nom qu'elle méritait, sous peu d'heures, s'assurait de sa proie : le malade succombait en attendant les crampes.

On a prétendu, que dans quelques cas, la mort a eu lieu, en l'absence d'aucun symptôme caractéristique : il y a lieu de croire qu'alors les symptômes prémoniteurs déterminaient une forte congestion cérébrale, ou apoplexie : Ces cas très rares, peuvent être considérés comme exceptionnels.

AGGRAVATION DES SYMPTOMES PRÉCITÉS OU 2ME PÉRIODE.—1 ° douleur à l'épigastre et à l'abdomen, plus ou moins intense ; 2 ° haleine froide ; 3 ° froideur générale ; 4 ° transpiration froide et abondante ; 5 ° consternation extrême ; 6 ° mouvements alternatifs, d'un côté à l'autre ; 7 ° respiration laborieuse ; 8 ° voix éteinte ; 9 ° yeux profonds, dans leurs orbites, altération de tous les traits et de tout le corps ; cyanose ; 10 ° cessation du pouls ; 11 ° perte de la vue et de l'entendement précédent la mort.

3ME PÉRIODE.—1 ° le pouls de 80 à 90, est mou ; 2 ° douleur de tête ; 3 ° torpeur et congestion cérébrales ; le visage se colore de plus en plus ; la conjonctive s'injecte ; 4 ° la langue, les alvéoles et les dents se recouvrent d'une croute brune ; 5 ° l'haleine est chaude et fétide. Cette transition à l'état fébrile, offre beaucoup d'analogie à un cas de typhus à l'état congestif, approchant de l'état comateux.

RAISONS PORTANT À CROIRE QU'IL N'EST PAS IMMÉDIATEMENT CON-