

vers le segment inférieur de l'utérus, des sensations qui ne correspondent pas à celles que produisent les sutures, surtout lorsque le doigt explore le cul-de-sac postérieur. Enfin l'on peut parfois dans les cas douteux percevoir le ballottement de la tête fœtale au fond de l'utérus, en faisant prendre à la malade la position genu-pectorale. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la possibilité de l'engagement du siège dans les dernières semaines de la grossesse, et la possibilité de l'erreur. Budin cite six cas à l'appui : trois primipares, trois multipares.—*Progrès médical*.—*Lyon médical*.

—

Modifications nouvelles dans le traitement de la vaginite, par TERRILLON.—Le nouveau mode de pansement consiste dans l'introduction de la pommade suivante, d'une préparation facile :

Vaseline.....	5 v.
Amidon	5 v.
Tannin	5 iss.

au moyen d'un instrument spécial (construit par Mathieu), qui se compose d'un réservoir terminé par un tube de 10 centimètres, dont l'extrémité est taillée en biseau ; le réservoir est muni d'un couvercle fermé au moyen d'un ressort. Le centre du couvercle donne passage à la tige d'un piston sur laquelle l'on presse pour chasser la pommade. Si la vulve est très-large, un tampon de ouate. En moyenne, il suffit de ne renouveler l'application de cette pommade que tous les sept à huit jours ; la quantité moyenne introduite est de 4 à 6 gros.

—

De l'hydrocèle vaginale simple et de son traitement par la méthode de Defer.—Parmi les divers procédés mis en usage pour la cure radicale de l'hydrocèle simple, le meilleur est assurément, dit M. le docteur Rol, celui de Defer.

Voici en quoi il consiste : L'hydrocèle est ponctionnée selon les règles habituelles, avec un trocart de moyen calibre, et le liquide évacué. Par la canule on introduit aussitôt une sonde cannelée, sur l'extrémité de laquelle on a préalablement fait fondre à la flamme d'une bougie, un peu de nitrate d'argent. La sonde porte-caustique est promenée rapidement en diffé-