

Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau sucrée, une demi-heure après les repas.

Chaque cuillerée à soupe contient environ IV gouttes d'acide chlorhydrique :

Acide chlorhydrique pur, 6 à 8 grammes

Sirop de limons, 200 grammes.

Eau distillée, 800 grammes.

Un verre à madère dans le cours du repas, contre l'hy-pochlorhydrie avec diarrhée.

Rappelons les formules complexes de Coutaret, où entrent les acides sulfuriques et nitrique :

Acide sulfurique pur, 2 gr. 40

Acide nitrique pur, 0 gr. 80.

Alcool à 80 degrés, 18 grammes.

Laissez en contact pendant quarante-huit heures, puis ajoutez :

Sirop de limons, 100 grammes

Eau de fontaine, 150 grammes.

Une cuillerée à soupe après les repas dans un demi-verre d'eau.

Acide nitrique pur, 3 grammes

Acide chlorhydrique pur, 4 grammes.

Alcool à 80 degrés, 12 grammes

Eau distillée, 16 grammes.

M. et ne buchez que deux heures après avoir fait le mélange, X à XX gouttes dans un peu d'eau, après les repas.

Acide sulfurique pur, 1 gr. 40

Acide nitrique pur, 0 gr. 40.

Alcool de vin à 80 degrés, 12 grammes.

Laissez en contact deux jours, puis ajoutez :

Elixir pavorique, 8 grammes.

Elixir de Garus, 80 grammes.

Eau de menthe, 80 grammes

Sirop d'éther, 80 grammes.

Cette potion réussit très bien contre le météorisme. On en donne, au moment du ballonnement, une cuillerée à soupe dans un peu d'eau.

+

TRAITEMENT DE L'OTITE MOYENNE AIGUE

Dans l'otite moyenne, l'infection primitive se fait par les trompes d'Eustache, mais ce n'est pas là l'infection dangereuse. Le danger ne semble survenir, en effet, que plus tard, quand l'oreille moyenne communique avec le conduit auditif par une perforation du tympan, quand les éléments d'infection secondaire se multiplient et pullulent dans le pus auriculaire, et viennent ainsi renforcer la virulence des premiers éléments pathogènes.

M. Henri Châtelier (*Archives de médecine des Enfants*) base sur ces données un nouveau traitement de l'otite moyenne aigue.

1o. *Soins avant la perforation.* — Dès qu'une otite est soupçonnée par les phénomènes fonctionnels, il faut procéder à la toilette du conduit auditif et des régions voisines. Couché le malade sur le côté sain, asperger d'alcool à 90

degrés du commerce toute la région, en prenant garde qu'il en coule dans l'oreille, puis procéder au nettoyage attentif et méticuleux du pavillon, de l'apophyse mastoïde et des régions voisines, avec des tampons de coton hydrophile imbibés d'alcool.

Puis remplir d'alcool le conduit et le fermer avec une bouteille d'ouate; c'est là un temps très douloureux du traitement. Après avoir mis une couche d'ouate pour soutenir le pavillon, on recouvre celui-ci d'une plaque de coton de 10 centimètres carrés au moins et on fixe le tout au moyen d'un bandage. Le pansement, avec nouveau nettoyage et nouveau bain d'alcool, sera changé toutes les six heures environ.

Il est nécessaire de nettoyer autant que possible l'intérieur du conduit à l'aide d'un stylet et armé d'ouate.

Les précautions aseptiques doivent être irréprochables. Nettoyage

2o. *Paracentèse.* — Si la paracentèse s'impose, les précautions de l'opérateur à la brosse, au savon et à l'alcool, nettoyage minutieux du conduit auditif et des régions environnantes. La paracentèse se fait suivant la technique ordinaire, puis le liquide issu de la caisse sera épongé soigneusement avec du coton hydrophile et le conduit sera complètement vidé.

3o. *Pansement après la paracentèse.* — Une mèche de gaze est appliquée exactement sur la perforation et tient lieu de drain. La longueur doit être suffisante pour déborder à l'extérieur l'orifice du conduit auditif et faire un tout absorbant avec le reste du pansement. Une compresse de gaze chiffonnée est appliquée sur le pavillon. Si l'otite s'est ouverte avant votre arrivée, imbibez légèrement d'alcool la mèche et la compresse de gaze et laissez les parties malades dans ce bain d'alcool pendant plusieurs heures avant d'appliquer le pansement sec. Un peu de coton hydrophile est placé en arrière du pavillon pour le soutenir. Une large laque d'ouate également hydrophile recouvre la région. Tout le pansement est fixé soit au moyen d'un bandage approprié, soit avec une bande.

4o. *Pansements ultérieurs.* — Le pansement doit être renouvelé; on observera toujours les règles de l'asepsie la plus rigoureuse et aussi souvent qu'il sera nécessaire, une ou deux fois par jour. Quand on aura enlevé les pièces du pansement, il faudra procéder au nettoyage du conduit auditif, enlever méticuleusement l'exsudat, tout particulièrement au voisinage de la perforation.

Avec un tel traitement, les otites moyennes aiguës, même les plus violentes, ne tardent pas à se calmer, la suppuration se tarit et la perforation tympanique se cicatrise. Le traitement ne présente qu'un inconvénient, c'est d'être douloureux: seulement il offre l'avantage de mettre à l'abri des suppurations longues et des grandes complications inflammatoires des otites.

