

1. Sous-fam. des CYGNINES. *Cygninae*.

Mêmes caractères que ceux du genre Cygne, le seul qu'elle renferme.

Gen. CYGNE. *Cygnus*, Linné.

Cou très long. Bec plus long que la tête, à base couverte par une peau molle se prolongeant jusqu'au milieu de l'œil. Narines à peu près à la moitié du bec. Partie inférieure de la jambe nue ; tarse bien plus court que le pied, très comprimé, couvert d'écaillés hexagonales qui deviennent plus petites sur les côtés et en arrière. Doigt postérieur très élevé, à lobe étroit. Queue à 20 penes ou plus, arrondie ou en coin. Même plumage dans les 2 sexes.

Les Cygnes sont les plus grands oiseaux de tout l'ordre des Palmipèdes ; ils sont essentiellement nageurs, et se rencontrent rarement sur terre. Ils se nourrissent particulièrement d'herbes aquatiques. Nous n'en rencontrons qu'une seule espèce dans notre Province et encore est-ce accidentellement.

Cygne d'Amérique. *Cygnus Americanus*, Sharpless. *Olor Amer.* Bonap. *Cygnus ferus*, Nutt.—Angl. *American Swan*.—Longueur 55 pouces ; ailes 22 ; tarses 4.25 ; bec 4.20 pouces. Blanc, bec et pattes noires, le premier avec une tache orange ou jaunâtre en avant de l'œil. Bec haut à la base, à plumes du front se terminant en demi-cercle. Narines s'ouvrant en arrière du milieu du bec.

R. et ACC.—Ce Cygne ne se rencontre que rarement en notre Province ; c'est celui qu'on voit dans presque toutes les pièces d'eau des parcs des villes des Etats-Unis. Nous en avons vus de magnifiques à Chicago. Quoique excellent nageur, il ne plonge jamais. Il se soumet facilement à la domesticité et se rend même en peu de temps familier avec ceux qui le visitent.

On en a vus, de temps à autres, sur le lac Memphragog. Ils couvent d'ordinaire dans le territoire de la Baie d'Hudson ; leurs nids se composent d'herbes sèches qu'ils posent sur les rivages. Leurs œufs, au nombre de 8 à 10, sont de forme ovale très prononcée et d'un vert olive pâle.

(A continuer).