

11. STOEBE *disticha*.

S. foliis fasciculatis mucronatis inermibusque, spica disticha. *Thunb. prod.* 169.

S. foliis fasciculatis recurvis, spicis bifariis. *Lin. suppl.* 391.

Zweyzeilige Stoebe. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h.

* 12. STOEBE *fasciculata*.

S. foliis fasciculatis trigono-fubulatis, spicis distichis. *Thunb. prod.* 169.

Büschelblättrige Stoebe. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h.

13. STOEBE *plumosa*.

S. foliis fasciculatis subulatis, spicis interruptis. *Thunb. prod.* 169.

Seriphium (plumosum) floribus spicatis sexfloris, foliis granulato-ovatis. *Sp. pl.* 1316.

Stoebe floribus spicatis, calycibus unifloris. *Roy. lugdb.* 145.

Breynia capensis, capitulis albis plumosis. *Pet. gaz.* 9. t. 5. f. 4.

Abrotanoides africanum, foliis cinereis muscosis, capitulis florum globosis magnis. *Raj. suppl.* 233.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 4. p. 440.

Federartige Stoebe. W.

Habitat ad Cap. b. spei. h.

Flores subquinqueflori. Folia filiformia. Flores laterales, sessiles, imbricati foliis granulatis.

† † † *Foliis muticis.*

14. STOEBE *fusca*.

S. foliis linearibus muticis tomentosis, capitulis terminalibus. *Thunb. prod.* 170.

Seriphium (fuscum) floribus capitatis unifloris, foliis imbricatis. *Sp. pl.* 1317.