

grisâtres, argileuses. Depuis, la malade a eu de nouvelles attaques. La constipation est habituelle. L'examen des selles n'a rien révélé. Pas de diathèse calculeuse dans sa famille.

Les calculs biliaires se retrouvent souvent surtout chez les personnes obèses et nous en avons un exemple dans Madame A... qui dit avoir été bien grasse et qui, en effet, est une personne d'une forte complexion.

Nos canadiennes sont généralement bien grasses, ce qui rend la maladie biliaire commune dans notre pays.

D'ailleurs, Cruveilhier dit que la diathèse biliaire est une des lésions les plus communes de l'espèce humaine, seulement un grand nombre de cas existent à l'état latent sans provoquer d'accidents.

L'usage continué des aliments gras contribue beaucoup à produire la cholélithe, c'est encore une raison pour laquelle nous rencontrons si souvent cette maladie chez nous. La colique hépatique n'est pas toujours héréditaire, mais elle l'est bien souvent, bien que nos deux sujets de clinique ignorent l'existence de cette diathèse dans leurs familles. Très souvent on trouve, dans l'histoire de la famille, de la goutte, de la gravelle urinaire, de la névralgie, de l'asthme, de l'urticaire, etc. Un fait bien remarquable, c'est que cette maladie s'observe bien plus souvent chez la femme que chez l'homme.

Un effort quelconque, une marche prolongée, une chute et même les émotions morales vives sont les causes qui réveillent souvent une attaque de colique biliaire.

Madame A... nous dit que sa maladie est survenue à la suite d'efforts qu'elle avait faits en entrant du bois. " Le sol était glissant, dit-elle, et à tout instant j'avais peur de tomber ; ce qui me faisait faire des efforts pour me maintenir debout."

Madame B... dit que ses douleurs sont venues à la suite d'un effort qu'elle a fait pour prendre son enfant.

Voulez-vous d'autres exemples, messieurs ? Un citoyen de Montréal me disait : Je revenais de me promener à cheval, arrivé à la maison, je sautai à terre et de suite j'ai eu une nouvelle attaque de ma maladie.

On rapporte que plusieurs amis faisaient un voyage pendant lequel ils jouaient aux cartes. L'un d'eux fit un tour d'adresse qui provoqua un éclat de rire général qui fut coupé court par la cholélithe qui venait de faire son apparition chez l'un des joueurs.

Quant aux émotions morales, je dois vous rappeler que les émotions en général produisent une hypersécrétion de toutes les glandes, et cela d'autant plus que l'émotion est plus grande. Or, le foie est une glande, et sa sécrétion, comme celle des autres glandes, est de beaucoup augmentée par les émotions morales, et cette hypersécrétion de la bile peut déplacer un calcul préexistant et déterminer une attaque de la maladie. Il ne faut cependant pas oublier que les efforts sont des causes fréquentes des accès. Toutefois les accès surviennent également d'une manière spontanée, deux ou trois heures après le repas, c'est-à-dire au moment où les aliments et la bile commencent à s'introduire dans le duodénum.

Maintenant le calcul siège le plus fréquemment dans la vésicule biliaire, bien qu'il se montre assez souvent dans les conduits hépatiques, le conduit cystique et dans le conduit cholédoque commun.

En un mot, le calcul peut se montrer partout où la bile séjourne.