nomène banal, commun à bien des maladies infectieuses ? Il faut tout d'abord remarquer que cette gastrite si spéciale de la cachexie tuberculeuse apparaît au moment où la fièvre hectique se manifeste et que cette fièvre hectique elle-même n'est que l'expression d'infections septicémiques surajoutées à l'infection tuberculeuse primitive. Si nous considérons, d'une part, que les lésions gastriques ne présentent pas le cachet habituel des lésions tuberculeuses, que la présence des bacilles n'a jamais été constatée en elles, que, d'autre part, la gastrite des phtisiques se différencie peu, dans ses caractères cliniques et anatomiques, de la gastrite que l'on peut voir chez les typhiques, à la période de convalescence, je serais assez disposé à admettre qu'il s'agit là d'accidents nouveaux, surajoutés, dus à la suppuration des cavernes. L'agent chimique ou vivant, cause première de ces altérations gastriques, se transmet-il par la voie des crachats inconsciemment déglutis ou par le sang ? C'est une question encore à l'étude et qui nécessite de nouvelles recherches.

Si la gastrite des tuberculeux ne peut être considérée comme un symptôme propre à la tuberculose des poumons, il n'en est pas de même de la dyspepsie du début de la phtisie. Cette gastropathie doit attirer toute notre attention. Lorsque vous verrez apparaître concurremment chez des malades des vomissements et de la toux, que nul autre phénomène cardiaque, circulatoire ou pulmonaire, ne vous donnera l'explication de ces symptômes et que, d'autre part, ces accidents ne seront que peu ou pas influencés par le traitement et s'accompagneront d'amaigrissement, vous devrez craindre l'évolution à plus ou moins longue échéance d'une tuberculose pulmonaire. Je voyais ces jours derniers une jeune fille chez laquelle l'examen le plus attentif ne permettait de constater autre chose que les symptômes d'une dyspepsie tenace. Le traitement très sérieux que cette maladie avait suivi, l'hygiène alimentaire à laquelle elle s'était astreinte n'avaient amené aucune amélioration. Cette dyspepsie me parut dès lors suspecte et un examen attentif des poumons me permit de déceler à l'un des sommets les symptômes d'une tuberculose tout à son début.

Cette gastropathie du stade initial de la tuberculose présente un tableau clinique qu'il est bon d'opposer à celui de la gastrite terminale des phtisiques.