

Chaque rucher malade devrait être traité, suivant la condition dans laquelle il se trouve, non seulement de manière à se débarrasser de la maladie, mais à augmenter considérablement le nombre des colonies et les avoir toutes en excellente condition.

C'est durant le temps de la maladie, lorsque les abeilles recueillent du miel en abondance, que l'on peut, d'une manière sûre augmenter le nombre de ses colonies, dans un rucher malade, et l'on fait cette augmentation en réunissant deux ruches pleines du meilleur couvain, avec environ une pinte d'abeilles, jusqu'à ce que la plus grande partie du couvain se soit éclos. On a ainsi un très gros essaim de jeunes abeilles, et lorsqu'elles seront placées dans une nouvelle ruche et traitées, il en résultera une colonie de première classe.

Dans chaque rucher que j'ai traité durant la miellée, j'ai toujours fait de l'augmentation, en réunissant le meilleur couvain, avec environ une pinte d'abeilles, et en le laissant jusqu'à ce que la plus grande partie du couvain soit éclos, et en le traitant alors justement de la même manière que les vieilles abeilles, que j'avais soignées en premier lieu.

Comment guérir les Ruches de la Loque.

Durant la miellée, lorsque les abeilles récoltent abondamment, enlevez les gâteaux, le soir, et secouez les abeilles dans leur propre ruche; donnez-leur des cadres garnis d'une lisière de fondation d'une largeur d'environ 2 pouces, et laissez-les bâtir durant quatre jours. Les abeilles travail-